

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 86, DE 24 DE JULHO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de banana no Estado do Amapá, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO SAMPAIO MARQUES

ANEXO

1 - NOTA TÉCNICA

A banana (*Musa* spp.) é alimento básico para milhões de pessoas no mundo tropical e considerada uma das principais fontes alimentares do mundo. O fruto está presente diariamente na mesa do brasileiro independente da classe social, garantindo emprego e renda para milhares de produtores.

Os elementos climatológicos mais importantes para o desenvolvimento da planta são a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a precipitação, a velocidade do vento e a radiação solar.

O déficit hídrico é prejudicial em todas as fases da planta, porém, se coincidir com os picos de floração e desenvolvimento dos frutos, acarretará em maiores prejuízos implicando em maior redução do potencial produtivo.

A bananeira é uma frutífera perene, ou seja, após a implantação do pomar, está presente e exposta às condições do campo ao longo de todo o ano. Nesse contexto, as fases de implantação do pomar, desenvolvimento inicial e a fase produtiva da cultura, apresentam características e necessidades distintas para as plantas.

Considerando que a composição dos riscos agroclimáticos é distinta, faz-se necessário, portanto, um zoneamento específico para o ciclo anual de produção e, a partir desse, uma delimitação das épocas mais propícias à implantação do pomar.

Importante salientar que é possível a ocorrência de municípios onde o nível de risco climático é viável para o pomar estabelecido, mas é inviável para a implantação. Nesses locais, a implantação do pomar só se viabiliza com irrigação complementar. Portanto, podem ocorrer municípios onde o pomar em produção de sequeiro se viabiliza (Zoneamento de Produção), mas a implantação em condição de sequeiro não é possível (Zoneamento de Implantação). Porém, não pode ocorrer o contrário, ou seja, municípios onde a implantação é viável, mas a produção não, pois a implantação do pomar só faz sentido onde a produção é viável.

Objetivou-se, com este zoneamento agrícola, identificar as áreas aptas e de menor risco climático para o ciclo anual de produção da lavoura de banana, bem como as datas mais favoráveis para a implantação do pomar.

Para esta cultura, os riscos analisados, majoritariamente, foram aqueles associados a condições térmicas e hídricas prejudiciais ou impeditivas à cultura.

I - CICLO E FASES FENOLÓGICAS

I.1 - Ciclo Anual de Produção

As diversas variedades de bananeiras foram agrupadas em três tipos, com características homogêneas.

- Bananeiras do tipo I ou Grupo Cavendish;
- Bananeiras do tipo II ou Grupo Maçã;
- Bananeiras do tipo III ou Grupo Prata;

Foi considerado como período crítico e mais sensível às condições meteorológicas, a fase reprodutiva compreendida desde a floração até o ponto de maturação do fruto. Tipo I (110 dias), Tipo II (110 dias) e Tipo 3 (130 dias). As definições da duração de frutificação se concentraram em valores médios de períodos mais quentes quando os estresses por déficit hídrico são mais relevantes.

I.2 - Implantação do Pomar

As diversas variedades de bananeiras foram classificadas em um único grupo de características homogêneas (Cavendish, Maçã e Prata). Para fins de simulação foram definidas três fases de desenvolvimento.

Fase 1 (Pegamento 30 dias), Fase 2 (Crescimento inicial 60 dias) e Fase 3 (Aceleração do crescimento 90 dias),

II - SOLOS

Os solos foram agrupados em três categorias quanto à capacidade de retenção de água associada à textura: Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média) e Tipo 3 (textura argilosa), considerando uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 0,6m, a capacidade de armazenamento dos solos foram, respectivamente, 42 mm, 66 mm e 90 mm.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo da banana em condições de baixo risco, considerou-se o índice de satisfação das necessidades de água (ISNA), sendo adotado os seguintes critérios:

II.1 – Ciclo Anual de Produção

O risco hídrico foi quantificado a partir da frequência de ocorrência de anos ou safras cujo período crítico, do florescimento a maturação do fruto, esteve sujeito a uma condição de restrição hídrica, caracterizada pelo índice de satisfação das necessidades de água (ISNA) abaixo de 0,49 para bananeiras do Tipo I (Grupo Cavendish), 0,46 para bananeiras do Tipo II (Grupo Maçã) e 0,41 para bananeiras do Tipo III (Grupo Prata).

Foi utilizado um valor médio e constante para o cultivo da bananeira, em fase de produção, de 0,85 para bananeiras Tipo I; 0,75 para bananeiras Tipo II; e de 1 para bananeiras Tipo III.

II.2 - Implantação do pomar:

O risco hídrico foi quantificado a partir da frequência de ocorrência de anos ou safras em que a Fase 1 ou Fase 3, estivessem sujeitas a uma condição de restrição hídrica, caracterizada pelo índice de satisfação das necessidades de água (ISNA) abaixo de 0,60.

Para classificação do risco, foi observado a frequência de atendimento do parâmetro ISNA e dos limites térmicos, nos anos avaliados, permitindo definir os níveis de risco em **20%** (80% dos anos atendidos), **30%** (70% dos anos atendidos) e **40%** (60% dos anos atendidos).

NOTA:

Entre as doenças que ameaçam a bananicultura, a Sigatoka-negra (*Mycosphaerella fijiensis*) é uma das mais graves que afetam a cultura, o desenvolvimento de lesões e a disseminação do fungo são influenciados pela umidade do ar, molhamento foliar, temperatura e vento.

Na região amazônica do Brasil, em função da interação com o clima, a doença causa grandes prejuízos, sendo imprescindível a utilização de variedades resistentes de bananeira. Não é recomendado o plantio do tipo Cavendish, em função da elevada sensibilidade e não disponibilidade de variedades resistentes.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de banana no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO

Devem ser utilizadas no plantio mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

NOTA:

- 1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos produtores de mudas.

**5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS E PERÍODOS INDICADOS PARA O CICLO DE PRODUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA BANANA**

5.1 BANANA TIPO I OU GRUPO CAVENDISH – PRODUÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA MANEJO DURANTE O CICLO ANUAL DE PRODUÇÃO								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá									1 a 36
Calçoene									1 a 36
Cutias								1 a 36	
Ferreira Gomes						1 a 36		1 a 36	
Itaubal								1 a 36	
Laranjal Do Jari						1 a 36			1 a 36
Macapá								1 a 36	
Mazagão						1 a 36		1 a 36	
Oiapoque									1 a 36
Pedra Branca Do Amapari		1 a 36			1 a 36		1 a 36		
Porto Grande			1 a 36		1 a 36			1 a 36	
Pracuúba								1 a 36	
Santana						1 a 36			1 a 36
Serra Do Navio		1 a 36			1 a 36		1 a 36		
Tartarugalzinho								1 a 36	
Vitória Do Jari						1 a 36		1 a 36	

5.2 BANANA TIPO I OU GRUPO CAVENDISH – IMPLANTAÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA PLANTIO DE MUDAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá							35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 26
Calçoene							35 a 10	34 + 26	33 + 23 a 25
Cutias							34 a 10		11 + 23 a 26 + 33
Ferreira Gomes				34 a 10	24	23 + 33 + 11	34 a 10	33 + 11 + 23 a 26	
Itaubal							35 a 10	34 + 11	33 + 23 a 26
Laranjal Do Jari				25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 11 + 24 a 25	33 + 23 + 26
Macapá							34 a 11	24 a 26	23 + 33
Mazagão				25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 +	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33

						11			
Oiapoque							26 + 35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25
Pedra Branca Do Amapari	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Porto Grande	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 27 + 33
Pracuúba							34 a 10		23 a 26 + 33
Santana				35 a 10	34 + 24	33 + 11 + 23 + 25 a 26	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33
Serra Do Navio	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Tartarugalzinho							34 a 10	11	23 a 26 + 33
Vitória Do Jari				25 + 35 a 9	24 + 34 + 10	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 24 a 25	33 + 11 + 23 + 26

5.3 BANANA TIPO II OU GRUPO MAÇÃ- PRODUÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA MANEJO DURANTE O CICLO ANUAL DE PRODUÇÃO								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Calçoene	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Cutias	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Ferreira Gomes	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Itaubal	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Laranjal Do Jari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Macapá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Mazagão	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Oiapoque	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Pedra Branca Do Amapari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Porto Grande	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Pracuúba	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Santana	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Serra Do Navio	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Tartarugalzinho	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Vitória Do Jari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		

5.4 BANANA TIPO II OU GRUPO MAÇÃ – IMPLANTAÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA PLANTIO DE MUDAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá	35 a 8	34 + 9	33 + 23	35 a 8	34 + 9 a 10	33 + 24	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 26
Calçoene	35 a 8	34 + 9 + 23	33	35 a 8	34 + 9 a 10 + 25	33 + 24	35 a 10	34 + 26	33 + 23 a 25
Cutias	35 a 8	34 + 9	33 + 23	34 a 9	10 + 24	23 + 33	34 a 10		11 + 23 a 26 + 33
Ferreira Gomes	35 a 9	34	33 + 10 + 23	34 a 10	24	23 + 33 + 11	34 a 10	33 + 11 + 23 a 26	
Itaubal	35 a 9	34	33 + 10 + 23	35 a 9	34 + 10 + 24	33 + 23	35 a 10	34 + 11	33 + 23 a 26
Laranjal Do Jari	35 a 9	34	33 + 24	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 11 + 24 a 25	33 + 23 + 26
Macapá	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a 24	34 a 10	24	23 + 25 a 26 + 33 + 11	34 a 11	24 a 26	23 + 33
Mazagão	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a 25	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33
Oiapoque	35 a 8	34 + 9 + 23	33	24 a 25 + 35 a 10	34	33	26 + 35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25
Pedra Branca Do Amapari	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Porto Grande	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 27 + 33
Pracuúba	35 a 8	34 + 9	33 + 23	35 a 8	34 + 9 a 10	33 + 24	34 a 10		23 a 26 + 33
Santana	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a 24	35 a 10	34 + 24	33 + 11 + 23 + 25 a 26	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33
Serra Do Navio	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Tartarugalzinho	35 a 9	34	33 + 23	34 a 10	24	23 + 33	34 a 10	11	23 a 26 + 33
Vitória Do Jari	35 a 8	34 + 9	33 + 24 a	25 + 35 a 9	24 + 34 +	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 24 a	33 + 11 +

			25		10			25	23 + 26
--	--	--	----	--	----	--	--	----	------------

5.5 BANANA TIPO III OU GRUPO PRATA – PRODUÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA MANEJO DURANTE O CICLO ANUAL DE PRODUÇÃO								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Calçoene	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Cutias	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Ferreira Gomes	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Itaubal	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Laranjal Do Jari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Macapá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Mazagão	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Oiapoque	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Pedra Branca Do Amapari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Porto Grande	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Pracuúba	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Santana	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Serra Do Navio	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Tartarugalzinho	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Vitória Do Jari	1 a 36			1 a 36			1 a 36		

5.6 BANANA TIPO III OU GRUPO PRATA – IMPLANTAÇÃO

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA PLANTIO DE MUDAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Amapá	35 a 8	34 + 9	33 + 23	35 a 8	34 + 9 a 10	33 + 24	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 26
Calçoene	35 a 8	34 + 9 + 23	33	35 a 8	34 + 9 a 10 + 25	33 + 24	35 a 10	34 + 26	33 + 23 a 25
Cutias	35 a 8	34 + 9	33 + 23	34 a 9	10 + 24	23 + 33	34 a 10		11 + 23 a 26 + 33
Ferreira Gomes	35 a 9	34	33 + 10 + 23	34 a 10	24	23 + 33 + 11	34 a 10	33 + 11 + 23 a 26	
Itaubal	35 a 9	34	33 + 10 + 23	35 a 9	34 + 10 + 24	33 + 23	35 a 10	34 + 11	33 + 23 a 26
Laranjal Do Jari	35 a 9	34	33 + 24	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 11 + 24 a 25	33 + 23 + 26
Macapá	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a	34 a 10	24	23 + 25 a 26 + 33 + 11	34 a 11	24 a 26	23 + 33

			24						
Mazagão	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a 25	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33
Oiapoque	35 a 8	34 + 9 + 23	33	24 a 25 + 35 a 10	34	33	26 + 35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25
Pedra Branca Do Amapari	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 25	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Porto Grande	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 34	23 + 26 a 27 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 27 + 33
Pracuúba	35 a 8	34 + 9	33 + 23	35 a 8	34 + 9 a 10	33 + 24	34 a 10		23 a 26 + 33
Santana	35 a 9	34	33 + 10 + 23 a 24	35 a 10	34 + 24	33 + 11 + 23 + 25 a 26	25 + 35 a 11	24 + 26 + 34	23 + 33
Serra Do Navio	35 a 9	34 + 10	33 + 23 a 24	25 + 35 a 10	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33 + 11	25 + 35 a 11	24 + 26 a 27 + 34	23 + 33
Tartarugalzinho	35 a 9	34	33 + 23	34 a 10	24	23 + 33	34 a 10	11	23 a 26 + 33
Vitória Do Jari	35 a 8	34 + 9	33 + 24 a 25	25 + 35 a 9	24 + 34 + 10	23 + 26 + 33	35 a 10	34 + 24 a 25	33 + 11 + 23 + 26