

PRODUTOR RURAL, FIQUE ATENTO AO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS E À COLHEITA DA SOJA

O Brasil foi notificado pela China sobre a **lista atualizada de espécies de plantas daninhas consideradas quarentenárias naquele país**, cujas sementes não podem estar presentes na produção de soja brasileira.

Por isso, adote sempre as boas práticas agrícolas no manejo de todas as plantas daninhas em sua lavoura!



PLANTAS DANINHAS QUARENTENÁRIAS: são as de **importância econômica potencial para a área em perigo**, onde ainda não estão presentes, ou, quando presentes, não se encontrem amplamente distribuídas, sob controle oficial.

A RESPONSABILIDADE É DE TODOS!

Em função dos riscos e prejuízos reais a toda a cadeia produtiva de soja foi instaurado no âmbito da Câmara Setorial da Cadeia da Soja do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), um grupo de trabalho com a participação das entidades representantes do setor. O objetivo é evitar a ocorrência destas pragas nas cargas de soja, por meio de campanha de adoção das boas práticas de:



CONTROLE NO CAMPO

Produtores, Pesquisa,
Cooperativas, Cerealistas,
Tradings, Revendas,
Indústria de Defensivos e
Sementes e MAPA



RECEPÇÃO E EXPORTAÇÃO


Cooperativas,
Cerealistas
e Tradings



COORDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO







Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Por que as plantas daninhas podem ser um problema no campo?



Quais as boas práticas recomendadas no manejo de plantas daninhas?

Controlar as plantas daninhas de forma correta, seguindo as boas práticas agrônômicas e os conceitos do Manejo Integrado de Plantas Daninhas (MIPD), ajuda na diminuição no custo de produção.

PREVENTIVO	 Faça a limpeza dos equipamentos. colheitadeira é a principal responsável pela disseminação de plantas daninhas	 Utilize sementes de soja com garantia da qualidade e da procedência	
CULTURAL	 Elimine as plantas daninhas antes da fase reprodutiva	 Faça rotação de culturas	
	 Faça o manejo de plantas daninhas o ano inteiro inclusive nos períodos de entressafra		 Não deixe áreas em pousio
			 Utilize plantas de cobertura
		QUÍMICO	
		 Faça rotação de mecanismos de ação dos herbicidas	
		 Utilize herbicidas pré-emergentes	
		 Utilize sempre as doses recomendadas em bula e por profissional habilitado	

As plantas daninhas listadas a seguir devem ter atenção redobrada, por serem consideradas quarentenárias na China:

NOME COMUM	NOME CIENTÍFICO
Capim Farpado	<i>Aegilops triuncialis</i> (syns. <i>Aegilops squarrosa</i>)
Carpineira	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
Aveia	<i>Avena barbata</i>
Aveião	<i>Avena sterilis ludoviciana</i>
Carrapicho, Timbête	<i>Cenchrus echinatus</i>
Cipó, chumbo, cipó, dourado, fios de ovos, aletria, cuscuta, espaguete	<i>Cuscuta</i> spp.
Crotalaria	<i>Crotalaria spectabilis</i>
Leiteira, amendoim bravo, flor de poetas, café do diabo	<i>Euphorbia heterophylla</i>
Maria pretinha	<i>Solanum torvum</i>
Capim massambará	<i>Sorghum halepense</i>
Tribulo, abrolho terrestre	<i>Tribulus alatus</i>
Carrapichão, quiabinho	<i>Xanthium</i> spp.
Sorgo	<i>Sorghum alnum</i>