

# Priorização de Testagem para Hepatites Virais

Programa Nacional de Hepatites Virais

Departamento de Doenças de  
Condições Crônicas e IST


Secretaria de Vigilância  
em Saúde - SVS | Ministério  
da Saúde

DISQUE  
SAÚDE  
136



# Hepatite C

Taxa de detecção de casos de hepatite C segundo faixa etária e sexo



**3/3 meses:**  
PrEP

**6/6 meses:**  
Hemodiálise

**Gestantes**

**≤ 12/12m:**

- PVHIV
- História IST ou uso inconsistente de preservativos
- Pessoas trans
- Trabalhadores do sexo
- Situação de rua
- Uso álcool ou outras drogas

**Ao menos 1x na vida (<40 anos):**

- DM
- HAS e outras doenças CV
- Uso prévio álcool ou outras drogas
- Doença hepática sem diagnóstico, doença renal, Psiq ou IS/Tx
- Profissionais de saúde e de segurança pública
- Privados de liberdade
- Exposição percutânea/parenteral que não obedecem às normas da vigilância sanitária;
- Filhos de mães com infecção pelo HCV;
- Parcerias sexuais ou que moram com pessoa com HCV
- Transf sangue < 1993

# Hepatite C – Testagem em gestantes

Aproveitar momento único de aproximação com serviços de saúde.  
Falhas no rastreamento por FR

Está associada a desfechos negativos para gestante (colestase) e para o RN (prematuridade e baixo peso)


Tratamento com elevada eficácia liberado para o pós-aleitamento e em estudo para uso na gestação

Disponíveis em:  
**Risco de TV: 5,8% (x2 em PVHIV sem supressão viral).**

- ✓ Evitar RM prolongada e procedimentos invasivos

[http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/Relatorio\\_Testagem\\_Universal\\_Hepatite\\_C\\_Gestantes\\_final\\_545\\_32\\_2020.pdf](http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/Relatorio_Testagem_Universal_Hepatite_C_Gestantes_final_545_32_2020.pdf)  
[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2020/Portaria\\_SCTIE-MS\\_32\\_2020.pdf](http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2020/Portaria_SCTIE-MS_32_2020.pdf)


# FLUXOGRAMA DE INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DA CRIANÇA EXPOSTA AO HCV



## IMPORTANTE

**Todas as gestantes deverão ser testadas para hepatite C pelo menos uma vez durante a gestação.**

# Hepatite B



Acumulado 94 – 2018. Fonte: <http://pni.datasus.gov.br>

# Hepatite B – Populações vulneráveis

## Também são para o HCV:

- Gestantes e filhos de mães HBsAg
- Uso de álcool ou outras drogas
- Gays e outros HSH
- Pessoas Trans
- PrEP, PEP ou atendimento para IST
- Múltiplas parcerias e/ou uso inconsistente de preservativo
- Trabalhadores do sexo
- Privados de liberdade
- Pessoas em situação de rua
- PVHIV e outras pop. IS
- DM, hepatopatia ou nefropatia crônicas
- Antecedente de exposição percutânea/parenteral que não obedecem às normas de vigilância sanitária
- Contatos domiciliares ou sexuais ou parentes 1º grau de indivíduo HBsAg reagente

Pessoas ou filhos de pessoas nascidas na região Amazônica ou imigrantes de regiões de alta endemicidade



Indígenas ou quilombolas

## Hepatite B – Exceção

Filhos de mães  
HBsAg reagente



HBsAg e Anti-HBs  
entre 9 e 12 meses  
de idade se IGHAHB

OU

Ou 1-2 meses da  
última dose vacinal  
se não recebeu  
IGHAHB



Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS | Ministério da Saúde

Obrigado!

Dúvidas: [tratamento.hepatites@ aids.gov.br](mailto:tratamento.hepatites@ aids.gov.br)  
(61) 3315-7694

DISQUE  
SAÚDE  
136

SUS+

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

PÁTRIA AMADA  
BRASIL  
GOVERNO FEDERAL