

ABIRATERONA, ACETATO DE PRÓSTATA

Metastático resistente à castração em homens que receberam quimioterapia prévia

ANASTROZOL MAMA

Adjuvante na pós-menopausa em mulheres com tumor receptor hormonal positivo

Câncer de mama metastático em mulheres na pós-menopausa com progressão da doença em uso de tamoxifeno

Primeira linha de tratamento em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama metastático receptor hormonal positivo

BICALUTAMIDA PRÓSTATA

Avançado em combinação com o tratamento com análogos do LHRH ou castração cirúrgica

Metastático em pacientes nos quais a castração cirúrgica ou medicamentosa não está indicada ou não é aceitável.

BUSSULFANO

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Sem especificação de fase da doença

CAPECITABINA

COLORRETAL

Adjuvante para pacientes em estágio II com critério de alto risco ou Dukes C (estágio III), submetidos à ressecção completa do tumor primário

Primeira Linha em câncer metastático

GÁSTRICO

Câncer em estágio avançado, desde que associado com compostos de platina, como a cisplatina ou oxaliplatina

MAMA

Metastático, após falha de antraciclina ou taxano, ou em face de contraindicação para estas medicações

CICLOFOSFAMIDA

LEUCEMIAS

Sem especificação de fase da doença

LINFOMAS

Sem especificação de fase da doença

MAMA

Sem especificação de fase da doença

MICOSE FUNGÓIDE

Estágios avançados

MIELOMA MÚLTIPLO

Sem especificação de fase da doença

NEUROBLASTOMAS

Em pacientes com disseminação

OVÁRIO

Sem especificação de fase da doença

RETINOBLASTOMAS

Sem especificação de fase da doença

CLORAMBUCILA

LINFOMA DE HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

LINFOMA NÃO-HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

LLC - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA

Sem especificação de fase da doença

DASATINIBE

LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA

Cromossomo Ph+ com resistência ou intolerância à terapia anterior

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Fases crônica, acelerada ou blástica mieloide/linfoide com resistência ou intolerância ao tratamento anterior incluindo imatinibe

DIETILESTILBESTROL

MAMA

Casos paliativos

PRÓSTATA

Casos paliativos

ERLOTINIBE, CLORIDRATO DE

PULMÃO NÃO PEQUENAS-CÉLULAS

Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irrissecável com mutação nos éxons 19 ou 21

ETOPOSÍDEO

LEUCEMIAS AGUDAS

Não linfocíticas

LINFOMA DE HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

LINFOMA NÃO-HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

MAMA

Doença recidivada

PULMÃO PEQUENAS CÉLULAS

Em combinação com outros agentes quimioterápicos

TESTÍCULO

Tumores refratários que já receberam tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico apropriados

EVEROLIMO

MAMA

Câncer de mama metastático receptor hormonal positivo após falha de primeira linha hormonal, em associação com exemestano

EXEMESTANO

MAMA

Adjuvante em mulheres na pós-menopausa com tumor receptor hormonal positivo, seja de início imediato ou após 2-3 anos de tratamento com tamoxifeno

Câncer de mama metastático em mulheres na menopausa, com tumores receptor hormonal positivo, seja em primeira linha, seja após falha de moduladores de receptor de estrogênio

Terapia pré-operatória em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama localmente avançado receptor hormonal positivo, com a intenção de permitir cirurgia conservadora da mama

FLUDARABINA

LINFOMA NÃO-HODGKIN

Tumores de baixo grau

LLC - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA

Tumores de células B

FLUTAMIDA

PRÓSTATA

Indicado como monoterapia (com ou sem orquiectomia) ou em combinação com um agonista LHRH ("luteinizando hormônio-releasing hormone"), no tratamento do câncer avançado em pacientes não-tratados previamente ou em pacientes que não responderam ou se tornaram refratários à castração

GEFITINIBE

PULMÃO NÃO PEQUENAS-CÉLULAS

câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irrissecável com mutação nos éxons 19 ou 21

quinta-feira, 13 de junho de 2013 **Aprovado**

GT Rol ANS 2014 Página 2 de 5

HIDROXIURÉIA

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Fase crônica

IMATINIBE

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS

Irressecável, recorrente ou metastático

DESORDENS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS

Associada com gene PDGFR rearranjado

LEUCEMIA EOSINOFÍLICA CRÔNICA

Na presença de certas mutações

LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA

Cromossomo Ph+ recaída ou refratária

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Recém diagnosticada LMC Cromossomo Ph+ fase crônica; crise blástica; fase acelerada; fase crônica após falha de interferon

MASTOCITOSE SISTÊMICA

Sem mutação c-Kit

TUMOR ESTROMAL GASTRINTESTINAL (GIST)

Adjuvante do tratamento de casos ressecados de alto risco

Irressecável ou metastático

LAPATINIBE, DITOSILATO DE

MAMA

Tratamento do tumor metastático HER2+ , após falha de trastuzumabe, em associação com capecitabina ou letrozol

LETROZOL

MAMA

Neoadjuvante, adjuvante ou metastático em mulheres na pós-menopausa com tumores receptor hormonal positivo

MEGESTROL, ACETATO DE

ENDOMÉTRIO

Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática)

MAMA

Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática)

MELFALANO

MIELOMA MÚLTIPLO

Sem especificação de fase da doença

OVÁRIO

Câncer avançado

MERCAPTOPURINA

LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA

Indução da remissão e manutenção

LMA - LEUCEMIA MIELÓIDE (MIELOCÍTICA, MIELÓGENA, MIELOBLÁSTICA, MIELOMONOCÍTICA) AGUDA

Indução da remissão e manutenção

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Sem especificação de fase da doença

METOTREXATO**CABEÇA E PESCOÇO**

Sem especificação de fase da doença

LINFOMA DE HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

LINFOMA NÃO-HODGKIN

Sem especificação de fase da doença

LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA

Sem especificação de fase da doença

MAMA

Sem especificação de fase da doença

SARCOMA OSTEOGÊNICO

Sem especificação de fase da doença

TUMOR TROFLOBLÁSTICO GESTACIONAL

Sem especificação de fase da doença

MITOTANO**CÓRTEX SUPRARENAL**

Carcinoma inoperável

NILOTINIBE**LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA**

Fase crônica acelerada, Ph+ resistentes ou intolerantes a terapia prévia incluindo imatinibe

PAZOPANIBE**RIM**

Irressecável ou metastático em primeira linha

SORAFENIBE**HEPATOCARCINOMA**

Em casos irressecáveis

SUNITINIBE, MALATO DE**RIM**

Irressecável ou metastático em primeira linha

TUMOR ESTROMAL GASTRINTESTINAL (GIST)

Tumor estromal gastrointestinal (GIST) após progressão da doença em uso de imatinibe ou intolerância ao imatinibe

TAMOXIFENO, CITRATO DE**MAMA**

Neoadjuvante, adjuvante ou metastático em carcinoma de mama com tumores receptor hormonal positivo

TEGAFUR - URACIL**COLORRETAL**

Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática

GÁSTRICO

Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática

TEMOZOLAMIDA**SNC - SISTEMA NERVOSO CENTRAL**

Glioblastoma multiforme em adjuvância ou doença recidivada

Glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, recidivante ou progressivo após terapia padrão

TIOGUANINA**LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA**

Sem especificação de fase da doença

LMA - LEUCEMIA MIELÓIDE (MIELOCÍTICA, MIELÓGENA, MIELOBLÁSTICA, MIELOMONOCÍTICA) AGUDA

Sem especificação de fase da doença

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

Sem especificação de fase da doença

TOPOTECANA, CLORIDRATO DE

OVÁRIO

Câncer metastático após falha da quimioterapia inicial ou subsequente

PULMÃO PEQUENAS CÉLULAS

Casos de recaída após falha de quimioterápico de 1a linha

TRETINOÍNA (ATRA)

LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA

Indução de remissão

VEMURAFENIB

MELANOMA

Metastático com mutação V600E do gene BRAF, primeira linha