

Antineoplásicos de uso oral *Principais indicações por localização do tumor*

CABEÇA E PESCOÇO

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

COLORRETAL

CAPECITABINA

Adjuvante para pacientes em estágio II com critério de alto risco ou Dukes C (estágio III), submetidos à ressecção completa do tumor primário

Primeira Linha em câncer metatático

TEGAFUR - URACIL

Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática

CÓRTEX SUPRARENAL

MITOTANO

Carcinoma inoperável

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS

IMATINIBE

Irressecável, recorrente ou metastático

DESORDENS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS

IMATINIBE

Associada com gene PDGFR rearranjado

ENDOMÉTRIO

MEGESTROL, ACETATO DE

Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática)

GÁSTRICO

CAPECITABINA

Câncer em estágio avançado, desde que associado com compostos de platina, como a cisplatina ou oxaliplatina

TEGAFUR - URACIL

Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática

HEPATOCARCINOMA

SORAFENIBE

Em casos irressecáveis

LEUCEMIA EOSINOFÍLICA CRÔNICA

IMATINIBE

Na presença de certas mutações

LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA

TRETINOÍNA (ATRA)

Indução de remissão

LEUCEMIAS

CICLOFOSFAMIDA

Sem especificação de fase da doença

LEUCEMIAS AGUDAS

ETOPOSÍDEO

Não linfocíticas

LINFOMA DE HODGKIN**CLORAMBUCILA**

Sem especificação de fase da doença

ETOPOSÍDEO

Sem especificação de fase da doença

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

LINFOMA NÃO-HODGKIN**CLORAMBUCILA**

Sem especificação de fase da doença

ETOPOSÍDEO

Sem especificação de fase da doença

FLUDARABINA

Tumores de baixo grau

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

LINFOMAS**CICLOFOSFAMIDA**

Sem especificação de fase da doença

LLA - LEUCEMIA LINFOCÍTICA (LINFOBLÁSTICA) AGUDA**DASATINIBE**

Cromossomo Ph+ com resistência ou intolerância à terapia anterior

IMATINIBE

Cromossomo Ph+ recaída ou refratária

MERCAPTOPURINA

Indução da remissão e manutenção

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

TIOGUANINA

Sem especificação de fase da doença

LLC - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA**CLORAMBUCILA**

Sem especificação de fase da doença

FLUDARABINA

Tumores de células B

LMA - LEUCEMIA MIELÓIDE (MIELOCÍTICA, MIELÓGENA, MIELOBLÁSTICA, MIELOMONOCÍTICA) AGUDA**MERCAPTOPURINA**

Indução da remissão e manutenção

TIOGUANINA

Sem especificação de fase da doença

LMC - LEUCEMIA MIELOCÍTICA (MIELÓIDE, MIELÓGENA, GRANULOCÍTICA) CRÔNICA

BUSSULFANO

Sem especificação de fase da doença

DASATINIBE

Fases crônica, acelerada ou blástica mieloide/linfoide com resistência ou intolerância ao tratamento anterior incluindo imatinibe

HIDROXIURÉIA

Fase crônica

IMATINIBE

Recém diagnosticada LMC Cromossomo Ph+ fase crônica; crise blástica; fase acelerada; fase crônica após falha de interferon

MERCAPTOPURINA

Sem especificação de fase da doença

NILOTINIBE

Fase crônica acelerada, Ph+ resistentes ou intolerantes a terapia prévia incluindo imatinibe

TIOGUANINA

Sem especificação de fase da doença

MAMA

ANASTROZOL

Primeira linha de tratamento em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama metastático receptor hormonal positivo

Adjuvante na pós-menopausa em mulheres com tumor receptor hormonal positivo

Câncer de mama metastático em mulheres na pós-menopausa com progressão da doença em uso de tamoxifeno

CAPECITABINA

Metastático, após falha de antraciclina ou taxano, ou em face de contraindicação para estas medicações

CICLOFOSFAMIDA

Sem especificação de fase da doença

DIETILESTILBESTROL

Casos paliativos

ETOPOSÍDEO

Doença recidivada

EVEROLIMO

Câncer de mama metastático receptor hormonal positivo após falha de primeira linha hormonal, em associação com exemestano

EXEMESTANO

Terapia pré-operatória em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama localmente avançado receptor hormonal positivo, com a intenção de permitir cirurgia conservadora da mama

Câncer de mama metastático em mulheres na menopausa, com tumores receptor hormonal positivo, seja em primeira linha, seja após falha de moduladores de receptor de estrógeno

Adjuvante em mulheres na pós-menopausa com tumor receptor hormonal positivo, seja de início imediato ou após 2-3 anos de tratamento com tamoxifeno

LAPATINIBE, DITOSILATO DE

Tratamento do tumor metastático HER2+ , após falha de trastuzumabe, em associação com capecitabina ou letrozol

LETROZOL

Neoadjuvante, adjuvante ou metastático em mulheres na pós-menopausa com tumores receptor hormonal positivo

MEGESTROL, ACETATO DE

Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática)

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

TAMOXIFENO, CITRATO DE

Neoadjuvante, adjuvante ou metastático em carcinoma de mama com tumores receptor hormonal positivo

MASTOCITOSE SISTÊMICA

IMATINIBE

Sem mutação c-Kit

MELANOMA

VEMURAFENIB

Metastático com mutação V600E do gene BRAF, primeira linha

MICOSE FUNGÓIDE

CICLOFOSFAMIDA

Estágios avançados

MIELOMA MÚLTIPLO

CICLOFOSFAMIDA

Sem especificação de fase da doença

MELFALANO

Sem especificação de fase da doença

NEUROBLASTOMAS

CICLOFOSFAMIDA

Em pacientes com disseminação

OVÁRIO

CICLOFOSFAMIDA

Sem especificação de fase da doença

MELFALANO

Câncer avançado

TOPOTECANA, CLORIDRATO DE

Câncer metastático após falha da quimioterapia inicial ou subsequente

PRÓSTATA

ABIRATERONA, ACETATO DE

Metastático resistente à castração em homens que receberam quimioterapia prévia

BICALUTAMIDA

Avançado em combinação com o tratamento com análogos do LHRH ou castração cirúrgica

Metastático em pacientes nos quais a castração cirúrgica ou medicamentosa não está indicada ou não é aceitável.

DIETILESTILBESTROL

Casos paliativos

FLUTAMIDA

Indicado como monoterapia (com ou sem orquiectomia) ou em combinação com um agonista LHRH ("luteinizing hormone-releasing hormone"), no tratamento do câncer avançado em pacientes não-tratados previamente ou em pacientes que não responderam ou se tornaram refratários à castração

PULMÃO NÃO PEQUENAS-CÉLULAS

ERLOTINIBE, CLORIDRATO DE

Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irresssecável com mutação nos éxons 19 ou 21

GEFITINIBE

câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irresssecável com mutação nos éxons 19 ou 21

PULMÃO PEQUENAS CÉLULAS

ETOPOSÍDEO

Em combinação com outros agentes quimioterápicos

TOPOTECANA, CLORIDRATO DE

Casos de recaída após falha de quimioterápico de 1a linha

RETINOBLASTOMAS

CICLOFOSFAMIDA

Sem especificação de fase da doença

RIM

PAZOPANIBE

Irressecável ou metastático em primeira linha

SUNITINIBE, MALATO DE

Irressecável ou metastático em primeira linha

SARCOMA OSTEOGÊNICO

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença

SNC - SISTEMA NERVOSO CENTRAL

TEMOZOLAMIDA

Glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, recidivante ou progressivo após terapia padrão

Glioblastoma multiforme em adjuvância ou doença recidivada

TESTÍCULO

ETOPOSÍDEO

Tumores refratários que já receberam tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico apropriados

TUMOR ESTROMAL GASTRINTESTINAL (GIST)

IMATINIBE

Irressecável ou metastático

Adjuvante do tratamento de casos ressecados de alto risco

SUNITINIBE, MALATO DE

Tumor estromal gastrointestinal (GIST) após progressão da doença em uso de imatinibe ou intolerância ao imatinibe

TUMOR TROFLOBLÁSTICO GESTACIONAL

METOTREXATO

Sem especificação de fase da doença