

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Ampliação do tempo de tratamento HCV - genótipo 3 com Cirrose, para 24 semanas - CONITEC

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição  |
|--------------|-----------------------|--|
| 28/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se for necessário mais tempo de tratamento é direito da pessoa e obrigação do poder público disponibilizar. Por que não disponibilizar tratamento de saúde se até sorvete fino e importado tem no avião do presidente da república!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atendi pacientes portadores de hepatite que usam medicamentos e muitos deles tiveram muita dificuldade para consegui. , Positivo: A melhora com os medicamentos ajuda a elevar a autoestima do sujeito e conforto aos familiares que sofrem junto com o paciente, Negativo: não se aplica</p> <p>3ª - Não</p>  |
| 29/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nosso PCDT para hepatite C já era excelente. Uma revolução na área. Parabéns ao Programa de IST Aids e Hepatites Virais. Com este último aprimoramento ficou totalmente em linha com a melhor evidência científica disponível. O pacientes irão se beneficiar muito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos do PCDT de Hepatite C. Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir., Positivo: Boa posologia, boa adesão, boa tolerância e segurança e alta eficácia, Negativo: Não são relevantes para a saúde pública. Gostaríamos que os custos caíssem mais para podermos tratar e curar mais pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema com veruprevir-ritonavir, ombitasvir, dasabuvir e ribavirina. Também já incorporados no SUS., Positivo: Os mesmos descritos acima., Negativo: Nada de relevante.</p> |
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina, Positivo: O tratamento com Daclatasvir e sofosbuvir foi totalmente positivo. Não senti nenhum efeito colateral., Negativo: A Ribavirina altera as hemacias e hemoglobulina, etc do hemograma causando anemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Nenhum, Negativo: Depressão, estado gripal, febre, frio, calor, muitos e muitos efeitos colaterais</p>  |
| 29/12/2016   | Interessado no tema   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Solfobusvir e Daclastavir, Positivo: Nos primeiros 28 dias os níveis dos exames estavam praticamente normais e em 40 dias voltou a disposição física norma sem fadiga extrema como acontecia, cessaram as dores no corpo., Negativo: Não aconteceram efeitos negativos.</p>  |
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, conheço pacientes que tomaram a medicação por 3 meses e não conseguiram se curar .O vírus voltou após alguns dias .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e daclastavir , Positivo: o maior efeito foi minha cura , sem efeitos colaterais ., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon, Positivo: nenhum, Negativo: muitos efeitos colaterais</p>   |
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não é preciso esperar o agravamento da enfermidade para receber tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>   |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição  |
|--------------|-----------------------|--|
| 23/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estes pacientes já apresentam doença muito avançada, que per si ja dificulta a respista ao tratamento. O gentipo 3 tem se mostrado mais difícil de erradicar quando comparado aos outros gentipos do HCV. O prolongamento para 24 semanas nesta população em especial poderá alcançar taxas semelhantes a aquelas atualmente encontradas nos cirroticos genótipo 1</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir e Daclatasvir para este fentipo, Positivo: O uso por 24 sem elevou a taxa de cura nestes pacientes, Negativo: Não vejo pontos negativos nesta escolha, atualmente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon peguilado, ribavirina e os antivirais de ação direta, telaprevir e Boceprevir ( estes dois últimos somente para genotipo 1), Positivo: Sms, Negativo: Sms</p>  |
| 28/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou em tratamento, sou de genótipo 1, estou F3. Concordo que o tratamento seja de 24 semanas para todos os casos (genótipos) de F2 em diante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sem sucesso no tratamento, anteriormente, com Ribavirina + Interferon. Atualmente estou tratando com Sofosbuvir + Daclatasvir, estou começando a terceira semana, e está tudo correndo muito bem, sem efeitos colaterais (como aconteceu com os anteriores). Grande avanço das ciências., Positivo: Espero ficar livre do HC, estou no começo do tratamento., Negativo: Os atuais oferecidos não me ocasionaram nenhum efeito colateral até agora. Maravilha!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon., Positivo: Não obtive resposta., Negativo: Efeitos colaterais pesadíssimos, ataca os dentes, cai o cabelo, dá coceira e queimação na pele e, o pior, depressão (perde-se o sentido de viver). Não resisti o tratamento além de três meses (era de um ano).</p> |
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante a incorporação dessa droga para os pacientes com HCV genótipo 3 com cirrose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilado e rabivirina, Positivo: me curei mesmo com chances de cura de apenas 30%, Negativo: emagreci, muita coceira, vermelhidão intenso. cansaço, fadiga.</p>   |
| 28/12/2016   | Instituição de saúde  | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não necessita comentários. É um direito do cidadão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalhei com pacientes com Hepatite no que diz respeito as questões emocionais, Positivo: A possibilidade de se tratar traz benefícios emocionais tanto para o paciente quanto para a sua família, Negativo: não se aplica</p> <p>3ª - Não</p>   |
| 28/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>   |
| 28/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, trabalho em um centro de referência e dentre os 3 pacientes de nosso serviço dentre os 180 tratados que terminaram o tratamento e tiveram recidiva 1 paciente era genótipo 3 e tinha indicação de tratar por 24 semanas porém o PCDT não contemplava o tratamento por 24 semanas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os dois sofosbuvir, dalcatavir, ribavirina simeprevir, Positivo: a alta taxa de resposta e pouco evento adverso, Negativo: Não tenho nada a relatar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon peguilado, boceprevir, telaprevir, , Positivo: cura para alguns pacientes em média 60% de RVS, Negativo: altas taxas de eventos adversos e evento graves como rasch anemia. eventos que levavam a internação em alguns casos</p>  |

| Dt. contrib. | Contribuiu como                         | Descrição da contribuição  |
|--------------|---|--|
| 27/12/2016   | Interessado no tema                     | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Apesar de haver poucas pesquisas científicas que comprovem a eficiência do prolongamento do tratamento de 3 para 6 meses, ficou evidente que essa extensão do tratamento contribuirá para a cura dos casos de HCV - genótipo 3, o que contribuirá para a redução da mortalidade por esta patologia. Por ano, o impacto no orçamento será de R\$ 36 milhões (R\$ 108 milhões em 3 anos), mas numa compra em grande quantidade desses medicamentos este impacto pode ser reduzido significativamente, gerando uma redução de custos deste investimento para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>  |
| 27/12/2016   | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta recomendação será de importância relevante na melhora do aproveitamento do tratamento e reduzirá a margem de falha dos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procedimento para tratamento de varizes, exames de rotina periodicos., Positivo: Evitou com sucesso emorragias e demais complicações, Negativo: Dores e dificuldades para alimentação.</p>   |
| 24/12/2016   | Profissional de saúde                   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito ser um avanço para um melhor tratamento do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir, sofosbuvir, Positivo: tolerabilidade muito boa e a resposta em si que foi ótima , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mesmos , Positivo: Os mesmos , Negativo: Os mesmo</p>   |
| 28/12/2016   | Paciente                                | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fiz o tratamento de 24 semanas e foi um sucesso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Daclastavir, Positivo: Melhora do estado físico geral, diminuição da ascite, melhora das funções do fígado, mesmo com cirrose F4, Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Não</p>  |
| 02/01/2017   | Interessado no tema                     | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>   |
| 10/01/2017   | Profissional de saúde                   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou coordenadora estadual de Hepatites Virais e da Camara Técnica da Secretaria de Estado de Saúde do rRo de Janeiro e esta era um demanda urgente para melhorar a RVS dos portadores de genótipo 3 com cirrose aos novos DAAs.Será um avanço na cura destes pacientes e de grande satisfação para o profissionais de saúde que se dedicam ao controle das hepatites Virais no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir e daclatasvir, Positivo: Com sofosbuvir e daclatasvir são muito bem tolerados pelos pacientes mas com cirrose a resposta virológica sustentada com 12 semanas de tratamento cai para menos de 70-75% e não dispomos ainda de resgate destes pacientes.A adição de ribavirina melhora estes índices mas causa mais efeitos colaterais e não garante taxas acima de 90%. , Negativo: Com uso concomitante de ribavirina em pacientes com cirrose mais avançada a anemia resultante pode descompensar o paciente e</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na era do interferon peguilado com iribavirina o genótipo 3 era considerado mais fácil de tratar apesar dos efeitos adversos do tratamento, Verificamos que os portadores de doença hepática avançada como cirrose não respondiam tão bem como os estágios menos avançados como F2 e F3. , Positivo: , Negativo: Depressão, irritabilidade, pancitopenia, infecções</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 10/01/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, os estudos mostram que a taxa de RVS é maior quando se faz o tratamento por 24 semanas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBOVIR, DACLATASVIR, Positivo: SOFOSBOVIR BOA TOLERANCIA E RVSDACLASTAVIR BOA TOLERANCIA E RVS MAIOR, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERON PEGUILADO, RIBAVIRINA, TELAPREVIR, BOCEPRVIR, Positivo: , Negativo: MUITOS EFITOS COLATERAIS, BAIXA TAXA DE RVS</p>   |
| 09/01/2017   | Sociedade médica      | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Represento neste documento a SBI, no entanto, pessoalmente já tive inúmeras experiências com o esquema em questão , ou seja com o uso de sofosbuvir associado a ribavirina pra o tratamento de apcientes com hepatite C cronica, genótipo 3.E infelizmente tenho observado vários casos de falha terapêutica co o uso desse esquema, de 12 semanas., Positivo: Os efeitos positivos principais são a capacidade de inibição de replicação do vírus da hepatite C e a alta taxa de sucesso trerapêutico, quando o tratamento de pacientes com genótipo 3, se faz por 24 semanas., Negativo: Os medicamentos em questão, apresentam alta taxa de efetividade terpêutica, quando utilizados em dose e em tempo adequado.No entanto, se o tempo de tratamento , em pacientes cirróticos, genótipo 3 for de 12 semanas (conforme o esquema atualmente em uso), a taxa de sucesso é de apenas 25% A 60%.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: No bRasil, até recentemente, o tratamento de pacientes com hepatite C genótipo 3, era realizado com a combinação de peginterferon associado a ribavirina., Positivo: A taxa de sucesso terapêutico variava de 50 a 70%., Negativo: O uso de interferon , principalmente em pacientes cirróticos é acompanhado, em porcentagem significatia de pacientes, por altas taxas de eventos adversos.</p> |
| 06/01/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta recomendação está de acordo com os guidelines da EASL. O tratamento por 24 semanas atenderia sobretudo os pacientes com restrições ao emprego de ribavirina (cirrose descompensada; anemia; insuficiência renal crônica).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina, Positivo: Elevada taxa de resposta virológica sustentada, com baixíssimo índice de efeitos adversos do Sofosbuvir e do Daclatasvir., Negativo: Anemia provocada pela Ribavirina.Sofosbuvir e Daclatasvir não tiveram efeitos negativos significativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Simeprevir, Interferon peguilado, Boceprevir, Telaprevir, Positivo: Simeprevir é restrito ao genótipo 1. Quando usado em conjunto com o Sofosbuvir, oferece elevada taxa de RVS.Boceprevir e Telaprevir também restritos ao genótipo 1, com taxa intermediária de RVS.Interferon é pan genotipico, também com taxa intermediária de RVS., Negativo: Interferon, Boceprevir e Telaprevir repletos de efeitos colaterais, alguns deles graves requerendo descontinuação do tratamento.</p>   |
| 06/01/2017   | Paciente              | <p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Cada caso é um caso. No meu por exemplo foi suficiente o tratamento de 12 semanas. Por enquanto, falta a avaliação de março qdo completa 1 ano do final do tratamento. Mas desde lá todos os controles feitos mantiveram a negatividade do virus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon mais Ribavirina e atualemtne Sofosbuvir, Dastaclavir e Ribavirina, Positivo: O segundo tratamento teve menos efeitos colaterais., Negativo: Interferon mais Ribavirina muitas reações: anemia, dor nas articulações, coceira no corpo. Muito cansaço e indisposição.No segundo tratamento anemia e cansaço. Engordei bastante pós tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>  |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 06/01/2017   | Interessado no tema   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já fui portador do vírus tipo 1b da Hepatite C, com fibrose avançada e já havia feito uma tentativa de tratamento anterior com interferon peguilado, ribavirina e telaprevir no qual infelizmente não consegui a cura. Devido ao fato de ter usado o inibidor de protease telaprevir, a recomendação do retratamento é sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas em vez de 12 semanas. Fiz o retratamento recomendado e consegui a cura, portanto posso dizer por experiência própria o quanto é importante fazer um tratamento recomendado de 24 semanas em vez de 12 semanas, pois se tivesse feito o retratamento em 12 semanas talvez não tivesse conseguido a cura.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Daclatasvir , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilado, ribavirina e telaprevir., Positivo: , Negativo:</p>  |
| 29/12/2016   | Interessado no tema   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes tem o direito de receber o tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>   |
| 03/01/2017   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fiz tratamento de 12 semanas infrutifero</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sufosbuvir e daclatasprevir se não errei na grafia, Positivo: Não houve, Negativo: Não eliminou o virus</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilado e ribavirina, Positivo: Desconheço, não sarei, Negativo: Muitos, o principal foi a fadiga extrema</p>  |
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador da Hepatite C genotipo 4 e realizei um tratamento em Novembro/2015 com uma nova medicaçã através de protocolo do Hospital da Clinicas da USP durante 12 semanas,tendo zerado os virus por 30 dias e após isso,os mesmos voltaram,ou seja,mei tempo de tratamento foi inadequado,deveria ter sido realizado por 24 semanas,conclusão do próprio corpo médico que me atende,agora estou a mais de um ano sem medicamento aguardando novos medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Como relatei anteriormente,não sei os nomes dos medicamentos utilizados,pois era um procedimento teste de novas medicações realizado pelo HCFMUSP em Novembro/2015, Positivo: Tive a negatividade dos virus durante 30 dias e avolta após o encerramento do tratamento de 12 semanas, Negativo: Não tive nenhuma reação negativa com o tratamento realizado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei durante 30 dias Interferon e Ribavirina., Positivo: Nenhum infelizmente esses medicamentos só fizeram mal., Negativo: Tomei como relatei anteriormente Ribavirina e Interferon,mas as reações foram violentas e tive que suspender com risco de vida,paralisação parcial dos rins,vomitos,desmaios e inapetencia com consequente fraqueza fisica.</p> |
| 01/01/2017   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SOU PORTADORA DE HEPATITE C F-4.fIZ MEU TRATAMENTO ,POREM A POSSIBILIDADE DE PROLONGAR PODE DEIXAR O PACIENTE MAIS SEGURO QUANTO A ELIMINAÇÃO DO VIRUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir + daclatasvir, Positivo: TOMEI O MEDICAMENTO E NÃO TIVE NENHUM EFEITO COLATERAL, Negativo: NEHUM</p>   |
| 01/01/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Paciente HCV Geno 3 maior risco de não responder clinicamente. E o cortiço tem mais dificuldade ainda para resposta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofusbovir daclatasvir ribavirina simeprevir, Positivo: Sofusbovir daclatasvir para Geno 3 com rvs até o momento . , Negativo: Efetivo negativo ainda não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon peguilado. Ribavirina . Boceprevir telaprevir . Interferon comum, Positivo: Muitos efeitos colaterais. Porém alguns pacts tiveram rvs, Negativo: Muitos efeitos colaterais. Sérios.</p>   |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 29/12/2016   | Paciente              | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, fiz tratamento e com 12 semanas com SOFOSBUVIR, DACLASTAVIR E RIBAVIRINA e como o primeiro exame não negativou quase no final do ultimo mes lutei, briguei e consegui continuar o tratamento com a ajuda da equipe médica do Hosp.das Clinicas em MG BHte. e ja no 4º mes fiz teste quantitativo e tinha baixado e no 5º mes negativou e estou ate hoje negativo, mas continuo com a cirrose e tendo atendimento médico a cada 3 meses.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: boceprevir, sofosbuvir e ribavirina, foram os que me negativaram. No ano de 2008 fiz com o tal INTERFERON, quase morri, e não negativei. Ainda bem que saiu de linha!, Positivo: NAO TIVE QUASE NENHUMA ALTERAÇÃO. TINHA APETITE, DORMIA NORMAL, E NÃO SENTI DOR ALGUMA., Negativo: NÃO TIVE NENHUM. OU TALVEZ UMA LEVE DESINTERIA DUAS VEZES EM 6 MESES, FRACA, QUASE NADA.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O TERRIVEL INTERFERON COM RIBAVIRINA, Positivo: COM O SOFOSBUVIR MAIS BOCEPREVIR MAIS RIBAVIRINA, ESTOU NEGATIVO, NAO TIVE NENHUM EFEITO COLATERAL., Negativo: EFEITOS NEGATIVOS TIVE COM O INTERFERON QUE ME DAVA DIARREIA, ENJOOS, TONTEIRA, DORES E NÃO ME NEGATIVOU. HORRIVEL!!</p> |
| 29/12/2016   | Interessado no tema   | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon pequilado -ribavirina-sofosbuvir, Positivo: negativei na quarta semana, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon convencional e ribavirina, Positivo: , Negativo: não negativei</p>   |
| 29/12/2016   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>  |
| 10/01/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, a taxa de rvs é significativamente maior com 24 sem em pac com geno 3 e cirrose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvirdaclatasvirribavirina, Positivo: maior taxa de rvs , Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvirvelpatasvir, Positivo: alta taxa de rvs , Negativo: não tem</p>  |
| 04/01/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos os estudos já corroboram tal ampliação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir, Daclatasvir, rbv, interferon peguilado, telaprevie, boceprevir, etc, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os antivirais para hepatite C e B, Positivo: neste caso, com os novos IP, verificamos maior eficacia e menos eventos adversos, maior segurança, Negativo: alto custo dos novos IPs e atraso na dispensação dos medicamentos</p>  |