

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Tacrolimo, micofenolato de mofetila ou sódico, sirolimo e everolimo para imunossupressão em transplante de Medula Óssea - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/01/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato, tacrolimo e sirolimo., Positivo: Necessários para complementar esquemas de imunossupressão dos pacientes, principalmente como estratégia de tratamento de doença do enxerto contra o hospedeiro em segunda linha, Negativo: os medicamentos apresentam toxicidades que devem ser ajustadas caso a caso, entretanto, os benefícios claramente superam os riscos</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Extremamente importante a incorporação destes medicamentos aos pacientes transplantados de medula óssea, garantindo melhores chances de sobrevivência, e principalmente melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MMF, sirolimus, tacrolimus com bons resultados em DECH crônico refratário, respostas entre 50-60% dos pacientes; sirolimus com resposta global em 80% dos DECH-A refratários e 30% de respostas completas., Positivo: MMF, sirolimus, tacrolimus com bons resultados em DECH crônico refratário, respostas entre 50-60% dos pacientes; sirolimus com resposta global em 80% dos DECH-A refratários e 30% de respostas completas., Negativo: MMF: diarreia, pancitopenia Sirolimus: hipotrigliceridemia Tacrolimus: hiperglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foroferece extracorporea(FEC), Positivo: A FEC tem excelente efeito imunomodulador sem imunossupressão, evitando assim as infecções, que são a maior causa de mortalidade nos pacientes com doença do enxerto. Também é o único procedimento que apresenta evidência de nível A em literatura, sendo poupador de corticoide. Primariamente utilizada para envolvimento cutâneo, também apresenta respostas em fígado, intestino e pulmão., Negativo: Complicações relacionadas ao cateter central necessário à realização do procedimento. O procedimento em si não apresenta efeitos colaterais significativos.</p>
26/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os citados acima, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EtanerceptFotofereses, Positivo: , Negativo:</p>
23/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É extremamente importante que tenhamos alternativas para pacientes que não respondem ou não possam usar as medicações aprovadas até o momento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os três medicamentos, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclosporina, methotrexate, Positivo: , Negativo:</p>
23/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclosporina, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, tacrolimo e sirolimo, Positivo: Diminuição da doença do enxerto contra o hospedeiro aguda, melhora do tratamento da Doença do enxerto contra o hospedeiro crônica. Isto pode ter como impacto positivo a melhora de qualidade de vida dos pacientes transplantados e aumento da cura. , Negativo: Os efeitos negativos de cada medicamento proposto não são diferentes do medicamento já amplamente utilizado para o transplante de medula óssea que é a ciclosporina.</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil e tacrolimus, Positivo: Menor toxicidade e efeitos colaterais da medicação em relação a ciclosporina, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sirolimus, tacrolimus e micofenolato de mofetil, Positivo: Os três medicamentos ficam como opção para substituição a ciclosporina caso o paciente apresente efeito colateral que contra-indique o seu uso com microangiopatia trombótica ou PRESS além de poder ser usado em associação a ciclosporina para tratamento de GVHD, neste último caso, sirolimus e MMF. O MMF também faz parte do protocolo de imunossupressão do transplante haploidêntico. , Negativo: MMF: reativação viral</p> <p>3ª - Não</p>