

19ª Reunião Extraordinária Conitec

Comitê de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

Data e horário:

13 de agosto de 2024 – 9h às 18h

1. Assinatura da ata da 131ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
3. Apreciação das contribuições de consulta pública do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Fabry.
Recomendação final de aprovação.
4. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Anemia Hemolítica Autoimune.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
5. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Gaucher.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
6. Apreciação das contribuições de consulta pública do:
 - a. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme; e
Recomendação final de atualização.
 - b. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Mieloma Múltiplo.
Recomendação final de aprovação.
7. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Angioedema Hereditário associado à deficiência de inibidor de C1-esterase.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
8. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose do tipo II.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
9. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabete Insípido.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

10. Apreciação das contribuições de consulta pública do:

- a. Protocolo de Uso de emicizumabe para tratamento de indivíduos com hemofilia A moderada e grave e inibidores do fator VIII da coagulação sanguínea; e

Recomendação final de atualização.

- b. Protocolo de Uso de fator VIII da coagulação na imunotolerância para indivíduos com hemofilia A e inibidor do fator VIII da coagulação sanguínea.

Recomendação final de atualização.