


**Júlia fez o teste de sífilis
logo no início do pré-natal.
Fábio também.**

Casal que combina em tudo não
pode deixar de proteger seu bebê.



Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br





Ações estratégicas para redução de sífilis no Brasil


Júlia fez o teste de sífilis
logo no início do pré-natal.
Fábio também.

Casal que combina em tudo não
pode deixar de proteger seu bebê.





Sífilis: notificação obrigatória permitiu melhoria da vigilância



FONTE: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2016.

(2) Sífilis adquirida em maiores de 12 anos e sífilis congênita em menores de um ano.

(3) Taxas de sífilis adquirida por 100.000 habitantes, taxas de sífilis em gestantes e sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos.

Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.


Saiba mais em www.aids.gov.br





Sífilis em adultos: meta é iniciar a queda de casos em um ano

Notificação obrigatória a partir de 2010.
Média nacional: 42,7 por 100 mil habitantes



Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br

FONTE: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

NOTAS: (1) Sífilis adquirida em maiores de 12 anos.


(2) Taxas de sífilis adquirida por 100.000 habitantes.





Sífilis em gestantes: prioridade é detecção no início da gestação

Maioria das gestantes descobre a sífilis entre o 2º e 3º trimestres



FONTE: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2016..

Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br






Pré-natal precoce e acesso a tratamento resultará na redução da sífilis congênita

Quanto maior a detecção de sífilis na gestação, menor a sífilis congênita

Média nacional da sífilis na gestação: 11,2

Média nacional da sífilis congênita: 6,5



FONTE: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

NOTAS: (1) Sífilis congênita em menores de um ano.

(2) Taxas de sífilis em gestantes e sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos.

Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.


Saiba mais em www.aids.gov.br





Tratamento adequado evita morte de bebês

**Penicilina é o medicamento mais eficaz,
seguro e barato para evitar mortes**



Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br


FONTE: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação
NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2016.





Ministério amplia acesso a testes rápidos para detecção precoce

- Em 2015 foram encaminhados aos estados **CINCO vezes mais testes** do que em 2012
- Aprovação do Cofen para a realização de teste rápido por profissionais de nível médio, que podem ser feitos também por técnicos e auxiliares, sob supervisão de enfermeiro
- 35 mil pessoas certificadas na capacitação à distância pelo Telelab: telelab.aids.gov.br



Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br





Profissionais estão sendo estimulados a utilizar a penicilina como tratamento

AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Compra emergencial de 2,7 milhões de ampolas de penicilina benzatina para abastecer aos estados e municípios. Distribuição iniciou em março de 2016 e a prioridade é para grávidas e parceiros;
- Iniciado processo de compra de 230 mil ampolas de penicilina cristalina;
- Portaria nº 3161/2011 que dispõe sobre a administração de penicilina nas unidades de Atenção Básica no SUS;
- Parceria com o Cofen que amplia a administração de penicilina na Atenção Básica pela equipe de enfermagem






Profissionais de saúde e população estão sendo orientados e qualificados

Manual de Diagnóstico





Boletim Epidemiológico



Folder das IST



Álbum Seriado das IST



Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br





Governo, sociedade médica e civil assinam compromisso para redução da sífilis

Monitoramento das ações de 15 de outubro de 2016 a 21 de outubro de 2017

- Implementação de comitês de investigação de transmissão vertical de HIV e sífilis nos estados e municípios;
- Estímulo a realização do pré-natal no início da gestação: captação precoce da gestante e do parceiro sexual;
- Ampliar a cobertura do diagnóstico por meio de testes rápidos;
- Incentivo à administração da penicilina na atenção básica;
- Mobilizar gestores e profissionais de saúde para realização de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.

Parceiros: Conass, Conasems, Opas, ABEn, ABF, AMB, Cofen, CFF, CFM, Febrasgo, SBDST, SOGIA, SBI, SBMFC, SBMT, SBP, Aids Healthcare Foundation (AHF)



Ministério lança campanha para prevenção a sífilis e estímulo ao pré-natal precoce



Casal que combina em tudo não pode deixar de proteger seu bebê.

Faça o teste de sífilis o quanto antes e evite que a doença seja transmitida para o bebê. É fundamental que o parceiro sexual também faça o teste. Se o resultado for positivo, o tratamento é garantido pelo SUS.

O que é a sífilis?

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que, se não tratada adequadamente, causa prejuízos sérios à saúde. Pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação, provocando aborto, lesões de pele e malformações. O bebê ainda pode nascer sem vida.

Quanto mais cedo você age, mais fácil tratar a doença.

Quando o parceiro é tratado, ainda nos primeiros meses da gestação, a sífilis pode ser tratada, impedindo a transmissão à criança.

O parceiro também precisa fazer o teste.

É fundamental que o parceiro também se previna, participe do pré-natal, faça o teste e, em caso de resultado positivo, inicio o tratamento imediatamente. Só assim é possível evitar uma nova infecção e garantir a saúde do bebê.

O teste é gratuito.

O teste rápido de sífilis é gratuito na rede pública de saúde. Por isso, não adie esse cuidado: se você está grávida, procure a unidade de saúde o quanto antes e exija o exame.

Previna-se contra a sífilis. Use camisinha.

O uso da camisinha feminina ou masculina é fundamental para prevenir a transmissão da sífilis e outras infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) nas relações sexuais. Nunca use um preservativo rasgado ou furado. Cada camisinha só deve ser usada uma vez.

Faça o teste de sífilis.

Combate à SÍFILIS CONGÊNITA

Sífilis tem cura. Procure uma unidade de saúde.

Saiba mais em www.aids.gov.br





Combate à
**SÍFILIS
CONGÊNITA**

