

Taxa de prevalência de hanseníase por 10.000 habitantes
Unidades da Federação, Regiões e Brasil, 2010 a 2023

Unidades da Federação / Regiões	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BRASIL	1,56	1,54	1,51	1,42	1,27	1,01	1,10	1,35	1,48	1,50	1,08	1,05	1,12	1,21
Região Norte	3,47	3,49	3,43	3,07	2,62	2,00	2,37	3,10	3,34	3,31	1,97	1,95	2,16	2,04
Rondônia	3,48	4,09	4,02	3,69	3,07	2,32	1,59	3,52	3,24	3,83	1,89	1,99	2,28	2,04
Acre	2,48	2,34	1,83	1,22	1,29	1,21	1,38	1,63	1,33	1,25	1,06	1,30	2,04	1,84
Amazonas	2,06	1,43	1,71	1,61	1,29	0,88	0,96	1,01	0,93	0,89	0,57	0,79	0,94	0,81
Roraima	2,26	1,87	2,41	2,89	1,31	1,60	1,56	2,81	2,09	1,87	1,00	1,10	0,69	0,84
Pará	4,15	4,33	4,07	3,76	3,12	2,26	2,55	3,20	3,24	3,09	1,85	1,82	1,87	1,80
Amapá	1,94	1,71	2,00	1,41	1,54	1,06	1,07	1,39	1,45	1,50	0,99	0,63	0,82	0,44
Tocantins	4,92	5,47	5,54	4,28	4,53	4,20	7,39	9,28	12,81	12,76	7,90	7,14	8,08	8,10
Região Nordeste	2,46	2,35	2,31	2,22	1,91	1,58	1,77	2,15	2,15	2,26	1,68	1,66	1,83	1,78
Maranhão	5,67	5,34	5,22	5,29	4,26	3,76	4,03	4,91	4,69	4,50	2,93	2,90	3,34	3,76
Piauí	3,47	2,84	2,78	2,65	2,49	2,08	2,40	3,16	2,95	2,93	2,10	2,78	2,42	2,16
Ceará	2,23	2,05	2,22	1,96	1,98	1,50	1,46	1,67	1,87	1,85	1,59	1,36	1,58	1,36
Rio Grande do Norte	0,74	0,80	0,84	0,76	0,65	0,50	0,86	0,86	0,69	0,63	0,54	0,50	0,54	0,53
Paraíba	1,45	1,74	1,40	1,47	1,06	0,85	1,60	1,63	1,53	2,03	1,49	1,28	1,11	1,20
Pernambuco	2,71	2,72	2,66	2,79	2,31	1,84	1,82	2,52	2,50	3,00	2,37	2,22	2,58	2,28
Alagoas	1,12	0,94	1,02	0,84	0,62	0,65	0,58	0,76	0,96	0,96	0,74	0,83	0,89	1,19
Sergipe	1,19	1,39	1,50	1,45	1,22	0,95	0,84	1,30	1,18	0,95	0,79	0,80	0,88	0,98
Bahia	1,85	1,75	1,67	1,50	1,33	1,12	1,40	1,60	1,68	1,80	1,29	1,33	1,49	1,39
Região Sudeste	0,62	0,61	0,57	0,48	0,42	0,34	0,36	0,42	0,46	0,50	0,39	0,44	0,45	0,49
Minas Gerais	0,69	0,66	0,64	0,51	0,44	0,42	0,43	0,54	0,61	0,68	0,60	0,61	0,72	0,79
Espírito Santo	1,68	2,01	1,74	1,44	1,10	0,94	0,59	0,88	0,92	1,11	1,00	1,64	0,74	1,15
Rio de Janeiro	0,97	0,91	0,81	0,67	0,55	0,41	0,50	0,60	0,62	0,59	0,37	0,38	0,39	0,37
São Paulo	0,36	0,36	0,34	0,32	0,31	0,23	0,25	0,26	0,28	0,32	0,25	0,28	0,32	0,34
Região Sul	0,43	0,44	0,44	0,37	0,31	0,29	0,25	0,29	0,30	0,34	0,26	0,28	0,30	0,29
Paraná	0,87	0,84	0,85	0,70	0,62	0,57	0,46	0,53	0,53	0,59	0,43	0,48	0,52	0,53
Santa Catarina	0,25	0,30	0,29	0,22	0,17	0,16	0,18	0,16	0,20	0,29	0,28	0,24	0,24	0,24
Rio Grande do Sul	0,11	0,12	0,12	0,13	0,10	0,10	0,09	0,12	0,14	0,13	0,09	0,11	0,10	0,07
Região Centro-Oeste	3,60	3,75	3,73	3,80	3,93	3,49	2,91	3,59	4,54	4,22	3,06	2,63	2,71	3,80
Mato Grosso do Sul	2,79	3,20	3,58	3,33	3,95	2,33	2,66	2,16	1,87	1,81	1,62	1,45	1,22	1,25
Mato Grosso	7,03	7,71	7,69	9,03	10,19	7,75	7,71	10,85	15,52	14,08	9,59	7,62	8,36	14,34
Goiás	3,34	3,34	3,00	2,71	2,07	1,76	1,62	1,73	1,85	1,79	1,31	1,31	1,13	1,02
Distrito Federal	0,93	0,57	0,91	0,80	1,06	0,52	0,68	0,99	0,87	1,03	0,93	1,05	0,81	0,46

Fonte: SINAN/SVSA/MS e E-SUS-VS ES

2023 Dados disponíveis em 31/05/2024

1990 a 2000: instrumentos de avaliação das Secretarias Estaduais de Saúde

*Fonte população: Dados de hanseníase em 2023 com dados populacionais de 2021 disponível no Datasus; de acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 41/2024-CGIAE/DAENT/SVSA/MS em 21/06/2024

¹Obs. Para o registro ativo, a partir de 2010 considera-se pacientes em tratamento de acordo com a PORTARIA GAB/SVS-MS de Nº 31, DE 8 DE JULHO DE 2005

²Obs. Para o registro ativo, a partir de 2015 considera-se pacientes em tratamento de acordo com a PORTARIA GAB/SVS-MS Nº 149 de 3 de fevereiro de 2016