

PROJETO CLOSE CERTO


Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Julho, 2016



Epidemia de HIV/Aids. Brasil, 2015


Contexto da epidemia de HIV/Aids



Fonte: Estudo realizado entre 2009 e 2013.

Aids: categoria de exposição



Distribuição dos casos de aids⁽¹⁾ em homens com 13 anos ou mais de idade, segundo categoria de exposição e ano de diagnóstico. Brasil, 2005 a 2015



Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Nota: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2015

Aids: detecção por sexo e faixa etária



Tendência de aumento entre os homens nas seguintes faixas etárias:

- 15 a 19 anos** → taxa mais que triplicada
- 20 a 24 anos** → taxa quase duplicada
- 25 a 29 anos** → aumento de 17,1%

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Notas: (1) Casos notificados no Sinan e Siscel/Siclom até 30/06/2015 e no SIM de 2000 a 2014



MINISTÉRIO DA SAÚDE



www.saude.gov.br/svs

Panorama Aids na Juventude – 15 a 24 anos



41% na taxa de detecção nos últimos 11 anos: 69,8 no sexo masculino e 30,2 no sexo feminino

2004


Notificados **3.419** casos de aids
taxa de detecção de **9,5**
por 100 mil habitantes



2014


Notificados **4.669** casos de aids
Taxa de detecção de **13,4**
por 100 mil habitantes

Relações sexuais antes dos 15 anos (%)



Fonte: PCAP; Estudos específicos realizados entre 2009 (RDS –PUD, HSH, PS) e 2013 (TLS – Crack).

Uso de preservativo na última relação casual



Fonte: PCAP; Estudos específicos realizados entre 2009 (RDS –PUD, HSH, PS) e 2013 (TLS – Crack).




MINISTÉRIO
DA SAÚDE



www.saude.gov.br/svs

Cobertura de teste de HIV na vida



Fonte: PCAP; Estudos específicos realizados entre 2009 (RDS –PUD, HSH, PS) e 2013 (TLS – Crack).



MINISTÉRIO DA SAÚDE



www.saude.gov.br/svs

Novas formas de comunicação

CONHEÇA O APLICATIVO  **GUARDIÕES DA SAÚDE**

Ele é um aplicativo gratuito de vigilância participativa no SUS. Isso significa que a população – visitantes ou residentes no Brasil – pode ajudar no monitoramento da saúde pública, informando a sua condição de saúde.

É importante destacar que a comunicação de sua condição de saúde não significa que estará recebendo atendimento médico. Se você estiver se sentindo bem, consulte um médico de referência ou vá ao posto de saúde mais próximo.

saude.mec.gov.br blog.saude.gov.br    

PCDT Criança e Adolescente
De Departamento de Informática do SUS – DATASUS

Altra o iTunes para comprar e baixar apps.

Descrição
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes, publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil e atualizado em 22 de abril de 2014, é um documento de referência a ser seguido em âmbito nacional.

Captura de telas

PROTOKOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA MANEJO DA INFECÇÃO PELLO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Considerações Iniciais: O que foi atualizado

INTRODUÇÃO

Aspectos epidemiológicos e de transmissão

Manejo de crianças na infância e adolescência

Imunizações

Diagnóstico e monitoramento

Revelação de resultados

Adesão ao tratamento

Compatibilidade: Requer o iOS 6.0 ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch.

Avaliações de clientes
Não recebemos avaliações suficientes para exibir uma média para a versão atual deste item.

PEP

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO AO HIV



SUS  **Ministério da Saúde**



Viva Bem

Senha de 4 dígitos

ENTRAR

Saúde do Viajante

Cuide de sua saúde. Em viagens de lazer ou a trabalho ela é sua melhor companheira.


Informe-se no site www.saude.gov.br/viajante, sobre como manter a sua saúde durante sua próxima viagem. **Não se esqueça:**

- Vá com as vacinas em dia e procure se manter bem hidratado. Evite áreas de grande humidade, ecologia, fumaça de cigarro ou áreas de muita poluição.
- Beba bastante água e evite consumir alimentos crus ou mal cozidos.
- Proteja-se contra o sol e a praga de insetos.
- Lave bem as mãos com água e sabão antes e depois de comer.
- Use camisola, roupas adequadas e equipamentos de proteção pessoal sobre calças, shorts, ou shorts quando necessário.
- Se ficar doente durante ou logo após retornar, procure o médico de saúde e informe em detalhes sobre sua viagem, pois esta informação poderá ajudar no diagnóstico de algumas doenças.

Em caso de emergência, ligue SAMU 192




Desafio global



Projeto Piloto

Close
CERTO

Ação online na rede Hornet



O projeto **Close Certo** tem o objetivo de promover online noções corretas sobre prevenção, teste e tratamento junto a um dos grupos mais vulneráveis a epidemia de HIV/aids no Brasil: jovens

Hornet: + de 1 milhão de usuários no país



Ação online na rede Hornet



Período: de 1º de agosto a 18 de setembro

18 jovens (3 tutores) capacitados pelo Ministério da Saúde

Informações sobre prevenção, diagnóstico, acesso a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e tratamento de HIV/aids

Mensagens Inbox

Mensagem sobre o projeto para os usuários do aplicativo

- Apresentação da iniciativa. **Informações sobre PEP e serviços de saúde. Compartilhamento de links.**
- Prevenção combinada e acesso a **preservativos.**
- **Disque Saúde**, contra a discriminação, disque 100 e serviços gratuitos afins.
- Outras Infecções sexualmente transmissíveis.

Exemplo



Miniguia para colaboradores

Conteúdo

Parte I - O que conversar

Panorama do HIV no Brasil
População-chave
Close na prevenção combinada
Camisinha
Tratamento como prevenção
Teste de HIV
PEP e PrEP: saiba as diferenças
Redução de danos
IST e Hepatite B
Estigma e discriminação, NÃO!
Vá lá no site!

Close na prevenção combinada



Parte II - Como conversar

Promovendo saúde na internet
Você no chat
Aplicativo e outras redes sociais
Espere ser encontrado
O projeto CLOSE CERTO
Foco no tema
Na dúvida, faça contato
Discriminação é close errado
Mantenha o sigilo
Nunca reaja
Conte a sua história
Horários de interação
Saiba a hora de parar a conversa
Exemplos de situações de conversa
Cópia e Cola

PEP e PrEP:

saiba as diferenças

PEP - DEPOIS

- Está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) o uso de medicamentos antirretrovirais como mais uma forma de prevenção contra o HIV. Isso é PEP.
- Chamada de PEP (sigla em inglês de profilaxia pós-exposição), a medida consiste na prescrição de medicamentos em até 72 horas após o contato do paciente com o vírus.
- O tratamento dura 28 dias e o atendimento é considerado de emergência pelo Ministério da Saúde, conforme prevê o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV.
- Muitas pessoas ainda chamam PEP de PEP sexual, mas sua indicação não é apenas para situações de violência sexual, podendo ser utilizada, por exemplo, em uma situação em que o profissional de saúde se expôs à infecção do HIV no ambiente de trabalho.

Preparação dos colaboradores
Conferências permanentes pela internet, grupo de mensagens instantâneas, relatórios (“diários de campo” sobre as interações), miniguia.

Apoio para a atuação online



Obrigada!

Adele Schwartz Benzaken
adele.benzaken@aids.gov.br

www.aids.gov.br
www.saude.gov.br/svs