



Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

VACINAÇÃO DE ROTINA

⚠ Priorizar o uso do mesmo imunizante do início de esquema.



Crianças

Entre 6 meses
a menores de 5 anos



Vacina Covid-19-RNAm,
Moderna Spikevax



Dose de 0,25 mL cada
Via intramuscular



DOSES



INTERVALOS

(1^a) — 4 SEMANAS — (2^a)



Vacina Covid-19-RNAm,
Pfizer Comirnaty **TAMPA VINHO**



Dose de 0,2 mL cada, vacina diluída
Via intramuscular



DOSES



INTERVALOS

(1^a) — 4 SEMANAS — (2^a) — 8 SEMANAS — (3^a)



Idosos

60 anos ou mais



Vacina Covid-19-RNAm
Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular



Vacina Covid-19-recombinante
Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular



Gestantes

Em qualquer período da gestação.

➡ 1(UMA) DOSE **A CADA GESTAÇÃO**

A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.



Vacina Covid-19-RNAm,
Pfizer Comirnaty **TAMPA AZUL**



Dose de 0,3 mL cada
Via intramuscular



Vacina
Covid-19-recombinante
Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular

As doses aplicadas devem ser registradas em um dos sistemas de informação, que enviem os dados para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)



Sistema de Informação
do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI)

OU



e-SUS APS PEC
Prontuário Eletrônico
do Cidadão

OU



e-SUS APS CDS
Coleta de Dados
Simplificada

OU



Sistemas de
informação próprios
ou terceiros



Regra de entrada de doses aplicadas nos sistemas de informação

Público da Vacina	Código da Estratégia de Vacinação	Descrição do CID-10
Crianças (6 meses a menores de 5 anos), Gestante, Idosos	1 - Rotina	—
Grupos prioritários	2 - Especial	Z258

VACINAÇÃO ESPECIAL



Grupos Especiais



Vacina Covid-19-RNAm Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular

Dose de 0,25 mL cada para menores de 12 anos



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA AZUL



Dose de 0,3 mL cada
Via intramuscular



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA AZUL) é recomendada somente para a população pediátrica entre 5 e 11 anos de idade.



Vacina Covid-19-recombinante Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular



A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.

GRUPOS ESPECIAIS

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores
- Pessoas imunocomprometidas
- Indígenas vivendo em terra Indígena
- Indígenas vivendo fora da terra Indígena
- Ribeirinhos
- Quilombolas
- Puérperas (se não vacinadas durante a gestação)
- Trabalhadores da saúde
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas privadas de liberdade
- Funcionários do sistema de privação de liberdade
- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua



Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade



Vacina Covid-19-RNAm Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular

Dose de 0,25 mL cada para menores de 12 anos



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA VINHO



Dose de 0,2 mL cada, vacina diluída
Via intramuscular

ESQUEMA PRIMÁRIO



VACINAÇÃO PERIÓDICA



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA VINHO) é recomendada somente para a população pediátrica menor de 5 anos de idade.

Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA AZUL) é recomendada somente para a população pediátrica entre 5 e 11 anos de idade.

A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.



Vacina Covid-19-recombinante Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada
Via intramuscular



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA AZUL



Dose de 0,3 mL cada
Via intramuscular



População geral entre de 5 e 59 anos de idade (sem vacinação prévia)



1 (UMA) DOSE

Imunizante disponível e recomendado para a faixa etária.



BAIXE AGORA A PUBLICAÇÃO ESTRATÉGIA DE
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - 2^a EDIÇÃO

bit.ly/covid192edicao



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

