DISQUE SAÚDE 136

PROFILAXIA DA **RAIVA HUMANA**

PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA

ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE

CÃO OU GATO

ANIMAL PASSÍVEL DE OBSERVAÇÃO E SEM SINAIS SUGESTIVOS DE RAIVA

LAVAR O FERIMENTO COM ÁGUA E SABÃO.
NÃO INICIAR PROFILAXIA E OBSERVAR O ANIMAL POR 10 DIAS.

VIVO E SAUDÁVEL.
NÃO INDICAR PROFILAXIA **INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE EXPOSIÇÃO.**

DESAPARECE, APRESENTA SINAIS DE RAIVA OU MORRE E **O DIAGNÓSTICO DE RAIVA NÃO PODE SER AFASTADO.**

ENCERRAR O CASO NO 10° DIA E NÃO INDICAR PROFILAXIA.

ANIMAL NÃO PASSÍVEL DE OBSERVAÇÃO POR 10 DIAS OU COM SINAIS SUGESTIVOS DE RAIVA.

MAMÍFERO DOMÉSTICO DE INTERESSE ECONÔMICO
(bovídeos , equídeos, caprinos, suínos e ovinos)

MAMÍFERO SILVESTRE
(ex.: morcego, raposa, macaco, sagui)

LAVAR O FERIMENTO COM ÁGUA E SABÃO. PROFILAXIA COM SORO (SAR OU GHAR)• E VACINA* (ID OU IM - DIAS 0, 3, 7 E 14).

AVALIAR O ACIDENTE

LEVE

- MORDEDURA OU ARRANHADURA SUPERFICIAIS NO TRONCO OU NOS MEMBROS, EXCETO MÃOS E PÉS;
- LAMBEDURA DE LESÕES SUPERFICIAIS.

LAVAR COM ÁGUA E SABÃO.
PROFILAXIA COM VACINA* (ID OU IM – DIAS 0, 3, 7 E 14).

GRAVE

- MORDEDURA OU ARRANHADURA NAS MUCOSAS, NO SEGMENTO CEFÁLICO, NAS MÃOS OU NOS PÉS;
- MORDEDURA OU ARRANHADURA MÚLTIPLAS OU EXTENSAS, EM QUALQUER REGIÃO DO CORPO;
- MORDEDURA OU ARRANHADURA PROFUNDAS, MESMO QUE PUNTIFORME;
- LAMBEDURA DE LESÕES PROFUNDAS OU DE MUCOSAS, MESMO QUE INTACTAS.

LAVAR COM ÁGUA E SABÃO.
PROFILAXIA COM SORO (SAR OU IGHAR)• E VACINA* (ID OU IM – DIAS 0, 3, 7 E 14).

CONTATO INDIRETO

- TOCAR OU DAR DE COMER PARA ANIMAIS LAMBEDURA EM PELE ÍNTEGRA
- CONTATO EM PELE ÍNTEGRA COM SECREÇÕES OU EXCREÇÕES DE ANIMAL, AINDA QUE RAIVOSO OU DE CASO HUMANO

MORCEGO

LAVAR COM ÁGUA E SABÃO.
PROFILAXIA COM SORO (SAR OU IGHAR)• E VACINA* (ID OU IM - DIAS 0, 3, 7 E 14)

OUTROS ANIMAIS EXCETO MORCEGO

LAVAR COM ÁGUA E SABÃO.
NÃO INDICAR PROFILAXIA.

*** VACINA**

A vacina deverá ser administrada por Via Intradérmica ou Via Intramuscular.

Via Intradérmica (ID): Volume da dose: 0,2mL. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administradas em dois sítios distintos, independente da apresentação da vacina, seja 0,5 mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Local de aplicação: inserção do músculo deltoide ou no antebraço.

Via Intramuscular (IM): Dose total: 0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco. Local de aplicação: no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 (dois) anos. Não aplicar no glúteo.

Soro (SAR ou IGHAR) •

O **SAR**, ou a **IGHAR**, deve ser administrado no dia 0. Caso não esteja disponível, aplicar o mais rápido possível até o 7° dia após a aplicação da 1° dose de vacina. Após esse prazo é contraindicado. Existindo clara identificação da localização da(s) lesão(ões), recentes ou cicatrizadas, deve-se infiltrar o volume total indicado, ou o máximo possível, dentro ou ao redor da(s) lesão(ões). Se não for possível, aplicar o restante por via IM, respeitando o volume máximo de cada grupo muscular mais próximo da lesão.
Soro antirrábico (SAR): 40 UI/kg de peso.
Imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR): IGHAR 20 UI/kg de peso.

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE