

TABELA 8.3 – Número de pessoas examinadas; médias por pessoa de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, na região Sudeste. Médias.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O. = C+O+E+EI
Até 2	15-19	443	5,650	4,492	2,212	1,038	6,688	6,704	13,392
	35-44	494	2,846	2,457	16,969	1,070	3,917	19,427	23,344
	50-59	337	1,516	0,875	23,727	1,281	2,798	24,602	27,400
3 e 4	15-19	499	3,332	6,583	1,496	0,603	3,935	8,080	12,016
	35-44	344	2,238	4,520	15,691	0,872	3,110	20,212	23,322
	50-59	268	0,899	1,582	23,992	0,944	1,843	25,574	27,417
5 e mais	15-19	562	1,291	9,727	0,727	0,197	1,489	10,455	11,944
	35-44	358	1,737	8,229	11,301	0,377	2,114	19,530	21,645
	50-59	286	0,972	3,520	21,968	0,524	1,496	25,489	26,986
Total	15-19	1,504	3,252	7,142	1,420	0,579	3,832	8,562	12,394
	35-44	1,196	2,339	4,778	14,905	0,806	3,145	19,683	22,829
	50-59	891	1,156	1,937	23,242	0,937	2,093	25,179	27,272

TABELA 8.4 – Número de pessoas examinadas; médias por pessoa de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, na região Sul. Médias.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O. = C+O+E+EI
Até 2	15-19	217	7,239	4,506	2,101	1,165	8,405	6,608	15,013
	35-44	237	5,282	2,687	13,738	1,248	6,531	16,426	22,957
	50-59	188	1,712	0,611	25,473	1,276	2,989	26,085	29,074
3 e 4	15-19	170	5,141	7,588	1,452	0,429	5,570	9,041	14,611
	35-44	154	4,090	5,110	13,402	0,402	4,493	18,512	23,006
	50-59	134	2,305	1,932	22,641	0,514	2,820	24,574	27,395
5 e mais	15-19	327	3,394	8,535	0,501	0,085	3,480	9,036	12,516
	35-44	156	3,583	8,807	8,519	0,448	4,032	17,326	21,358
	50-59	106	2,320	5,933	16,971	0,320	2,641	22,905	25,547
Total	15-19	714	4,578	7,085	1,214	0,495	5,474	8,299	13,774
	35-44	547	4,462	5,115	12,155	0,782	5,244	17,270	22,515
	50-59	428	2,049	2,343	22,481	0,801	2,850	24,824	27,675

TABELA 8.5 – Número de pessoas examinadas; médias por pessoa de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, na região Centro-Oeste. Médias.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O = C+O+E+EI
Até 2	15-19	263	6,889	3,528	3,000	1,083	7,973	6,528	14,501
	35-44	276	2,963	1,800	18,481	1,304	4,268	20,282	24,550
	50-59	143	1,468	0,657	25,797	1,153	2,622	26,454	29,076
3 e 4	15-19	184	5,146	6,010	2,086	0,423	5,570	8,097	13,668
	35-44	141	2,950	3,893	15,404	0,702	3,652	19,297	22,950
	50-59	51	1,647	1,705	20,627	1,117	2,764	22,333	25,098
5 e mais	15-19	292	4,462	8,058	1,297	0,226	4,688	9,356	14,044
	35-44	149	2,543	7,281	11,013	0,442	2,986	18,295	21,281
	50-59	87	1,298	4,333	19,149	0,551	1,850	23,482	25,333
Total	15-19	739	5,496	5,936	2,100	0,580	6,077	8,036	14,113
	35-44	566	2,849	3,765	15,749	0,927	3,777	19,514	23,291
	50-59	281	1,448	1,985	22,800	0,960	2,409	24,786	27,195

TABELA 8.6 – Número de pessoas examinadas; médias por pessoa de dentes cariados, obturados, extraídos, com extração indicada e somatório CPO; na população de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, segundo o nível de renda familiar, no Brasil. Médias.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Dentes cariados (C)	Dentes obturados (O)	Dentes extraídos (E)	Dentes com extração indicada (EI)	C + EI	O + E	C.P.O = C+O+E+EI
Até 2	15-19	1.621	5,938	3,525	2,982	1,098	7,036	6,508	13,544
	35-44	1.599	3,188	1,803	16,762	1,233	4,421	18,566	22,988
	50-59	1.047	1,440	0,574	24,468	1,234	2,675	25,042	27,718
3 e 4	15-19	1.372	4,385	5,785	1,946	0,556	4,942	7,732	12,674
	35-44	938	2,918	3,750	15,302	0,719	3,638	19,053	22,691
	50-59	640	1,225	1,300	23,792	0,798	2,023	25,092	27,115
5 e mais	15-19	1.805	2,669	8,080	0,964	0,186	2,856	9,045	11,901
	35-44	807	2,371	7,489	10,992	0,469	2,841	18,482	21,323
	50-59	569	1,223	3,766	20,977	0,435	1,659	24,743	26,402
Total	15-19	4.798	4,264	5,885	1,927	0,600	4,865	7,812	12,677
	35-44	3.344	2,915	3,721	14,960	0,904	3,820	18,682	22,503
	50-59	2.256	1,324	1,585	23,395	0,909	2,234	24,981	27,215

TABELA 8.7 — Comparação de médias entre as regiões e das regiões com o total nas faixas de 15 a 19, 35 a 44 e 50 a 59 anos, para o índice CPO-D e para os componentes C + Ei e O + E¹

Regiões ^{1,2} e país	15 a 19			35 a 44			50 a 59		
	CPO-D	C + Ei	O + E	CPO-D	C + Ei	O + E	CPO-D	C + Ei	O + E
	M1, M2	-0,0740*	3,8147	-3,1300	4,9213	-2,2717	5,3244	3,9013	1,2511*
M2, M3	-2,1304	4,7480	-5,7552	-5,3713	4,3287	-6,5771*	3,0781	-1,3869*	-2,0884
M3, M4	-5,1265	-7,2014	0,9760*	1,0312	-8,6769	5,4468	-1,0919*	-3,1401	0,7397*
M4, M5	-1,1153*	-2,2287	0,8252*	-1,9704	5,0917	-4,2823	0,9819*	1,3551*	0,0472*
M1, M3	-2,0206	8,1353	-8,7657	1,3378*	0,9754*	0,7290*	1,7315	0,1939*	1,3753
M1, M4	-6,1090	-0,0801*	-0,3649*	1,9611	-5,8182	4,5329	0,8684*	-2,3348	1,7969
M1, M5	-7,4714	-2,5068	-5,4141	0,4180*	-1,1338*	1,9189*	1,5775*	-0,7672*	1,6726
M2, M4	-6,4124	-3,4421	-3,7511	-3,9892	-4,3974	-0,9526*	-3,7442	-3,9127	-1,2912*
M2, M5	-7,8864	-5,9568	-2,7911	-5,7257	1,1605*	5,2273	-2,4094	-1,9770	-1,1240*
M3, M5	-6,6949	-9,6655	1,9282	-1,1822*	-2,551	0,6431*	0,1715*	-1,0826*	0,6841*
M1, MT	-3,5337	3,3540	-6,5821	2,1478	-1,5707*	2,5707*	2,6369	-0,3788*	1,8593
M2, MT	-3,8857	-1,6224*	-2,9287	-5,1027	1,4351*	-4,8789	-3,2064	-2,2510	-1,8756
M3, MT	-1,7220	-7,4674	4,3908	1,3075*	-4,2355	3,2866	0,2146*	-0,9109*	0,6008*
M4, MT	4,4909	2,9237	2,0759	-0,0969*	6,6022	-3,6147	1,4582*	-2,8122	-0,3666*
M5, MT	6,2259	5,7560	0,9593*	2,3598	-0,1803*	1,9961	-0,0468*	0,0335*	-0,3600*

Notas: 1: A um nível de confiança de 95%, os valores assinalados em asteriscos (*) representam diferenças estatisticamente não significantes.

2: M1 = Região Norte; M2 = Região Nordeste; M3 = Região Sudeste; M4 = Região Sul; M5 = Região Centro-Oeste; MT = Total Brasil.

CPO-D = Índice de dentes cariados, perdidos e obturados; C + Ei = Dentes Cariados e com extração indicada; O + E = Dentes Obturados e Extraídos.

TABELA 8.8 — Comparação de médias entre distintos estratos de renda familiar e de cada estrato com o total para o índice CPO-D e para os componentes C + Ei e O + E nas faixas de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, Brasil¹

Estrato de renda ²	CPO-D			C + Ei			O + E		
	15 a 29	35 a 44	50 a 59	15 a 19	35 a 44	50 a 59	15 a 19	35 a 44	50 a 59
Brasil									
I, I	3,9916	0,8839*	1,6931	11,7212	4,0743	3,2684	-5,7176	-1,2873*	-0,1152*
I, II	8,2318	5,3447	3,6969	26,8066	8,5359	5,4988	-12,8930	0,1944*	0,7082*
II, III	3,8491	4,0731	0,9654*	14,1017	4,2517	1,9649	-6,6816	1,4592*	0,7634*
I, I T	4,9924	1,9992	1,9024	14,8138	3,9104	2,7429	-7,5812	-0,4399*	0,1813*
II, I T	0,0000*	0,7256*	0,3041*	0,5092*	-1,1457*	-1,3134*	0,4648*	1,1159*	0,2937*
III, I T	-5,0472	-4,3946	-2,5774	-19,0650	-6,5631	-4,0559	8,1934	-0,6702*	-0,6617*

Notas: 1: A um nível de confiança de 95%, os valores assinalados em asteriscos (*) representam diferenças estatisticamente não significantes.

2: I = Renda familiar de 0 a 2 salários-mínimos; II = Renda familiar de 3 a 4 salários-mínimos; III = Renda familiar de 5 e mais salários-mínimos; T = Renda familiar média.

CPO-D = Índice de dentes cariados, perdidos e obturados; C + Ei = Dentes Cariados e com extração indicada; O + E = Dentes Obturados e Extraídos.

TABELA 8.9 — Percentual de pessoas aos 18 anos de idade com todos os dentes, segundo o estrato de renda — Brasil *

Estrato de renda	% sem extrações E = zero	% sem extrações e sem extrações indicadas E + Ei = zero
Até 2 salários-mínimos	26	17
3 e 4 salários-mínimos	36	29
5 e mais salários-mínimos	57	52
Total	39	32

* Meta da OMS/FDI = 85%

7.3. Doenças periodontais em adolescentes e adultos: dados consolidados

O número e o percentual de pessoas sadias do ponto de vista periodontal e com necessidades de tratamento segundo o número e média de sextantes estão expostos, respectivamente, nas tabelas 9.1 a 9.6 e 10.1 a 10.6.

Especifica-se, no caso dos tratamentos, a indicação do tipo — higiene oral (pessoas com códigos 1, 2, 3 e ou 4 em algum sextante), profilaxia (códigos de exame 2 e ou 3) ou cirurgia (código 4) — e a média de sextantes em cada condição, por pessoa examinada e por pessoa afetada. Assim, de acordo com os dados globais do país, temos, por exemplo, na tabela 10.6, que no grupo de 35-44 anos 71% das pessoas precisam realizar higiene oral metódica em 3,7 sextantes em média, cada, dado que se aproxi-

ma do constatado no grupo de 15-19 anos (69,5% com 3,9 sextantes por pessoa afetada, embora ocorra uma forte redução para 46,6% das pessoas de 50-59 anos em função do peso que aí tem as extrações totais, que se fazem presentes em 49,7% da população. As necessidades de profilaxia são bastante elevadas em todos os grupos, enquanto que apenas nos adultos os tratamentos cirúrgicos alcançam representatividade.

As diferenças entre os estratos de renda são nítidas, observando-se o pior quadro periodontal sistematicamente junto ao estrato de menores ganhos.

Desigualdades regionais de monta também existem, particularmente na faixa de 15-19 anos, cabendo, sem dúvida, uma análise mais aprofundada acerca de suas causas.

TABELA 9.1 — Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento									
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos (X em todos)	
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes		Número de pessoas
Até 2	15-19	353	98	238	693	167	416	4	7	7	7	
	35-44	217	14	141	402	115	334	2	4	4	54	
	50-59	200	6	76	228	64	178	6	17	17	114	
3 e 4	15-19	208	45	159	550	113	317	1	1	1	0	
	35-44	83	3	60	155	36	87	0	0	0	18	
	50-59	71	0	24	41	15	27	0	0	0	45	
5 e mais	15-19	190	81	107	307	73	171	1	2	2	1	
	35-44	31	0	22	57	14	37	0	0	0	6	
	50-59	26	0	14	28	10	20	0	0	0	12	
Total	15-19	751	224	504	1.500	353	904	6	10	10	8	
	35-44	331	17	223	614	165	458	2	4	4	78	
	50-59	297	6	114	297	89	225	6	17	17	171	

TABELA 9.2 — Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento										Nulos (X em todos)
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Número de pessoas		
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes			
Até 2	15-19	345	67	1.082	224	780	4	6	4	4	4		
	35-44	375	4	1.151	252	895	31	69	31	84	84		
	50-59	179	0	312	71	234	23	46	23	93	93		
3 e 4	15-19	311	84	852	176	561	6	12	6	1	1		
	35-44	216	9	654	148	495	13	22	13	39	39		
	50-59	116	0	195	49	138	14	29	14	57	57		
5 e mais	15-19	434	103	1.199	253	782	4	8	4	0	0		
	35-44	113	8	397	87	291	8	12	8	9	9		
	50-59	64	2	96	27	74	7	13	7	29	29		
Total	15-19	1.090	254	3.133	653	2.123	14	26	14	5	5		
	35-44	704	21	2.202	487	1.681	52	103	52	132	132		
	50-59	359	2	603	147	446	44	88	44	179	179		

TABELA 9.3 — Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento										Nulos (X em todos)
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Número de pessoas		
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes			
Até 2	15-19	443	95	344	1.494	245	794	6	8	1	1		
	35-44	494	19	324	1.133	250	725	27	60	122			
	50-59	337	3	154	432	111	262	48	79	168			
3 e 4	15-19	499	221	278	1.071	154	481	2	4	0			
	35-44	344	19	245	811	197	516	27	55	69			
	50-59	268	5	116	332	84	207	22	39	135			
5 e mais	15-19	562	303	257	1.081	105	258	0	0	0			
	35-44	358	37	269	977	197	543	17	24	35			
	50-59	286	3	158	503	119	323	21	38	118			
Total	15-19	1.504	619	879	3.646	504	1.533	8	12	1			
	35-44	1.196	75	838	2.921	644	1.784	71	139	226			
	50-59	891	11	428	1.267	314	792	91	156	421			

TABELA 9.4 – Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento										Nulos (X em todos)
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Número de pessoas		
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes			
Até 2	15-19	217	14	200	1.023	170	622	0	0	2	2		
	35-44	237	0	189	814	163	592	16	33	47			
	50-59	188	0	71	208	56	162	12	20	117			
3 e 4	15-19	170	26	142	670	105	357	1	1	1	1		
	35-44	154	7	116	482	97	312	2	2	30			
	50-59	134	0	71	239	64	177	5	10	62			
5 e mais	15-19	327	53	274	1.259	157	415	0	0	0	0		
	35-44	156	14	131	584	110	367	3	11	11			
	50-59	106	2	67	285	58	171	3	10	36			
Total	15-19	714	93	616	2.952	432	1.394	1	1	3	3		
	35-44	547	21	436	1.880	370	1.271	21	46	88			
	50-59	428	2	209	732	178	510	20	40	215			

TABELA 9.5 — Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento									
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos (X em todos)	
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes		
Até 2	15-19	263	58	194	692	169	514	3	6	0		
	35-44	276	6	165	507	423	13	28	80			
	50-59	143	1	54	130	120	4	4	87			
3 e 4	15-19	184	54	125	402	97	289	0	0	0		
	35-44	141	11	86	275	232	5	8	35			
	50-59	51	2	28	83	69	1	1	21			
5 e mais	15-19	292	78	212	675	172	509	2	2	0		
	35-44	149	29	97	312	91	255	9	15	11		
	50-59	87	6	46	122	37	93	1	2	28		
Total	15-19	739	190	531	1.769	438	1.312	5	8	0		
	35-44	566	46	348	1.094	317	910	27	51	126		
	50-59	281	9	128	335	113	282	6	7	136		

TABELA 9.6 — Número de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e número de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, no Brasil.
Frequência absoluta.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento									
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos (X em todos) Número de pessoas	
			Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes	Número de pessoas	Número de sextantes		
Até 2	15-19	1.621	332	1.232	4.984	975	3.126	17	27	14		
	35-44	1.599	43	1.098	4.007	928	2.969	89	194	387		
	50-59	1.047	10	439	1.310	350	956	93	166	579		
3 e 4	15-19	1.372	430	924	3.545	645	2.005	10	18	2		
	35-44	938	49	669	2.377	556	1.642	47	87	191		
	50-59	640	7	298	890	240	618	42	79	320		
5 e mais	15-19	1.805	618	1.178	4.521	760	2.135	7	12	1		
	35-44	807	88	613	2.327	499	1.493	37	62	72		
	50-59	569	13	315	1.034	251	681	32	63	223		
Total	15-19	4.798	1.380	3.334	13.050	2.380	7.266	34	57	17		
	35-44	3.344	180	2.380	8.711	1.983	6.104	173	343	650		
	50-59	2.256	30	1.052	3.234	841	2.255	167	308	1.122		

TABELA 10.1 — Percentual de pessoas saudias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Norte.*

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Saudias e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)
			Saudias (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Média de sextantes por pessoa		% de pessoas		
			% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	Examinada	Afetada	Examinada	Afetada			
													Média de sextantes por pessoa	Média de sextantes por pessoa	
Até 2	15-19	353	27,762	67,422	1,963	2,911	1,178	2,491	0,019	1,750	1,133	1,750	1,983		
	35-44	217	6,451	64,976	1,852	2,851	1,539	2,904	0,018	2,000	0,921	2,000	24,884		
	50-59	200	3,000	38,000	1,140	3,000	0,890	2,781	0,085	2,833	3,000	2,833	57,000		
3 e 4	15-19	208	21,634	76,442	2,644	3,459	1,524	2,805	0,004	1,000	0,480	1,000	0,000		
	35-44	83	3,614	72,289	1,867	2,583	1,048	2,416	0,000	0,000	0,000	0,000	21,686		
	50-59	71	0,000	33,802	0,577	1,708	0,380	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	63,380		
5 e mais	15-19	190	42,631	56,315	1,615	2,869	0,900	2,342	0,010	2,000	0,526	2,000	0,526		
	35-44	31	0,000	70,967	1,838	2,590	1,193	2,642	0,000	2,000	0,000	2,000	19,354		
	50-59	26	0,000	53,846	1,076	2,000	0,769	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	46,153		
Total	15-19	751	29,826	67,110	2,063	3,075	1,203	2,560	0,013	1,666	0,798	1,666	1,065		
	35-44	331	5,135	67,371	1,854	2,753	1,383	2,775	0,012	2,000	0,604	2,000	23,564		
	50-59	297	2,020	38,383	1,000	2,605	0,757	2,528	0,057	2,833	2,020	2,833	57,575		

* O total de 100% tem sido dado pela soma de pessoas saudias, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes nulos e ainda pelas que só têm sextantes saudias ou nulos. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 10.2 — Percentual de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Nordeste.*

Estrato de renda familiar (Em salários mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profílexia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Média de sextantes por pessoa		% de pessoas		
			% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	% de pessoas			
					Examinada	Afetada			Examinada	Afetada					
Até 2	15-19	345	19,420	74,202	3,136	4,226	2,260	3,482	0,017	1,500	1,159	1,159	1,159		
	35-44	375	1,066	74,400	3,069	4,125	2,386	3,551	0,184	2,225	8,266	22,400	22,400		
	50-59	179	0,000	46,927	1,743	3,714	1,307	3,295	0,256	2,000	12,849	51,955	51,955		
3 e 4	15-19	311	27,009	70,739	2,739	3,872	1,803	3,187	0,038	2,000	1,929	0,321	0,321		
	35-44	216	4,166	75,000	3,027	4,037	2,291	3,344	0,101	1,692	6,018	18,055	18,055		
	50-59	116	0,000	50,862	1,681	3,305	1,189	2,816	0,250	2,071	12,068	49,137	49,137		
5 e mais	15-19	434	23,732	75,576	2,762	3,655	1,801	3,090	0,018	2,000	0,921	0,000	0,000		
	35-44	113	7,079	83,185	3,513	4,223	2,575	3,344	0,106	1,500	7,079	7,964	7,964		
	50-59	64	3,125	46,875	1,500	3,200	1,156	2,740	0,203	1,857	10,937	45,312	45,312		
Total	15-19	1,090	23,302	73,761	2,874	3,896	1,947	3,251	0,024	1,857	1,284	0,458	0,458		
	35-44	704	2,982	75,994	3,127	4,115	2,387	3,451	0,146	1,980	7,386	18,750	18,750		
	50-59	359	0,557	48,189	1,679	3,485	1,242	3,034	0,245	2,000	12,256	49,860	49,860		

* O total de 100% seria dado pela soma de pessoas sadias, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes nulos e ainda pelos que só têm sextantes sadios ou nulos. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 10.3 — Percentual de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Sudeste.*

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)	
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)				Profilaxia (2 e/ou 3)				Tratamento cirúrgico (4)			
			% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		
					Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada		Afetada
Até 2	15-19	443	21,444	77,652	3,372	4,343	1,792	3,240	1,354	0,018	1,333	0,225	0,000			
	35-44	494	3,846	65,587	2,293	3,496	1,467	2,900	5,465	0,121	2,222	24,696	0,000			
	50-59	337	0,890	45,697	1,281	2,805	0,777	2,360	14,243	0,234	1,645	49,851	0,000			
3 e 4	15-19	499	44,288	55,711	2,146	3,852	0,963	3,123	0,400	0,008	2,000	0,000	0,000			
	35-44	344	5,523	71,220	2,357	3,310	1,500	2,619	7,848	0,159	2,037	20,058	0,000			
	50-59	268	1,865	43,283	1,238	2,862	0,772	2,464	8,208	0,145	1,772	50,373	0,000			
5 e mais	15-19	562	53,914	45,729	1,923	4,206	0,459	2,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	35-44	358	10,335	75,139	2,729	3,631	1,516	2,756	4,748	0,067	1,411	9,776	0,000			
	50-59	286	1,048	55,244	1,758	3,183	1,129	2,714	7,342	0,132	1,809	41,258	0,000			
Total	15-19	1.504	41,156	58,444	2,424	4,147	1,019	3,041	0,531	0,008	1,506	0,066	0,000			
	35-44	1.196	6,270	70,066	2,442	3,485	1,491	2,770	5,936	0,116	1,957	18,896	0,000			
	50-59	891	1,234	48,035	1,421	2,960	0,888	2,522	10,213	0,175	1,714	47,250	0,000			

* O total de 100% está dado pela soma de pessoas sadias, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes nulos e ainda pelas que só têm sextantes nulos ou nulos. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 10.4 — Percentual de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Sul.*

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)		Profilaxia (2 e/ou 3)		Tratamento cirúrgico (4)		Nulos				
			% de pessoas	% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa	
Até 2	15-19	217	6,451	92,165	4,714	5,115	78,341	2,866	3,658	0,000	0,000	0,000	0,921		
	35-44	237	0,000	79,746	3,434	4,306	68,776	2,497	3,631	0,139	2,062	19,831			
	50-59	188	0,000	37,765	1,106	2,929	29,787	0,861	2,892	0,106	1,666	62,234			
3 e 4	15-19	170	15,294	83,529	3,941	4,718	61,764	2,100	3,400	0,005	1,000	0,588			
	35-44	154	4,545	75,324	3,129	4,155	62,987	2,025	3,216	0,012	1,000	19,480			
	50-59	134	0,000	52,985	1,783	3,366	47,761	1,320	2,765	0,074	2,000	46,268			
5 e mais	15-19	327	16,207	83,792	3,850	4,594	48,012	1,269	2,643	0,000	0,000	0,000			
	35-44	156	8,974	83,974	3,743	4,458	70,512	2,352	3,336	0,070	3,666	7,051			
	50-59	106	1,886	63,207	2,688	4,253	54,716	1,613	2,948	0,094	3,333	33,962			
Total	15-19	714	13,025	86,274	4,134	4,792	60,504	1,952	3,226	0,001	1,000	0,420			
	35-44	547	3,839	79,707	3,436	4,311	67,641	2,323	3,435	0,084	2,190	16,087			
	50-59	428	0,467	48,831	1,710	3,502	41,588	1,191	2,865	0,093	2,000	50,233			

* O total de 100% seria dado pela soma de pessoas sadias, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes nulos e ainda pelos que só têm sextantes sadios ou nulos. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 10.5 — Percentual de pessoas saudas e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, na região Centro-Oeste.*

Estrato de renda familiar (Em salários-mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos) % de pessoas	
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)				Profilaxia (2 e/ou 3)				Tratamento cirúrgico (4)			
			% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		
					Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada		Afetada
Até 2	15-19	263	22,053	73,764	2,631	3,567	64,258	1,954	3,041	1,140	0,022	2,000	0,000	0,000		
	35-44	276	2,173	59,782	1,836	3,072	53,623	1,532	2,858	4,710	0,101	2,153	28,985	28,985		
	50-59	143	0,699	37,762	0,909	2,407	33,566	0,839	2,500	2,797	0,027	1,000	60,839	60,839		
3 e 4	15-19	184	29,347	67,934	2,184	3,216	52,717	1,570	2,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	35-44	141	7,801	60,992	1,950	3,197	55,319	1,645	2,974	3,546	0,056	1,600	24,822	24,822		
	50-59	51	3,921	54,901	1,627	2,964	54,901	1,352	2,464	1,960	0,019	1,000	41,176	41,176		
5 e mais	15-19	292	26,712	72,602	2,311	3,183	58,904	1,743	2,959	0,684	0,006	1,000	0,000	0,000		
	35-44	149	19,463	65,100	2,093	3,216	61,073	1,711	2,802	6,040	0,100	1,666	7,382	7,382		
	50-59	87	6,896	52,873	1,402	2,652	42,528	1,068	2,513	1,149	0,022	2,000	32,183	32,183		
Total	15-19	739	25,710	71,853	2,393	3,331	59,269	1,775	2,995	0,676	0,010	1,600	0,000	0,000		
	35-44	566	8,127	61,484	1,932	3,143	56,007	1,607	2,870	4,770	0,090	1,888	22,261	22,261		
	50-59	281	3,202	45,551	1,192	2,617	40,213	1,003	2,495	2,135	0,024	1,166	48,398	48,398		

* O total de 100% seria dado pelo soma de pessoas saudas, com necessidade de higiene oral, com todas as sextantes nulos e ainda pelos que só têm sextantes sadios ou nulos. Esse último dado não consta na tabela.

TABELA 10.6 – Percentual de pessoas sadias e com necessidades de tratamento periodontal pelo tipo de tratamento e média de sextantes, segundo o estrato de renda familiar, no Brasil.*

Estrato de renda familiar (Em salários mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sadios e necessidades de tratamento												Nulos (X em todos)	
			Sadios (0 em todos)		Higiene oral (1, 2, 3, 4)			Profilaxia (2 e ou 3)			Tratamento cirúrgico (4)					
			% de pessoas	% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		% de pessoas	Média de sextantes por pessoa		
					Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada	Afetada		Examinada		Afetada
Até 2	15-19	1.621	20,481	76,002	3,074	4,045	1,928	3,206	1,048	0,016	1,588	0,853				
	35-44	1.599	2,689	68,667	2,505	3,649	1,856	3,199	5,585	0,121	2,179	24,202				
	50-59	1.047	0,955	41,929	1,251	2,984	0,913	2,731	8,882	0,158	1,784	55,300				
3 e 4	15-19	1.372	31,341	67,346	2,583	3,836	1,461	3,108	0,728	0,013	1,800	0,145				
	35-44	938	5,223	71,321	2,534	3,553	1,750	2,953	5,010	0,092	1,851	20,362				
	50-59	640	1,093	46,562	1,390	2,986	0,965	2,575	6,562	0,123	1,880	50,000				
5 e mais	15-19	1.805	34,238	65,263	2,504	3,837	1,182	2,809	0,387	0,006	1,714	0,055				
	35-44	807	10,904	75,960	2,883	3,796	1,850	2,991	4,584	0,076	1,675	8,921				
	50-59	569	2,284	55,360	1,817	3,282	1,196	2,713	5,623	0,110	1,968	39,191				
Total	15-19	4.798	28,761	69,487	2,719	3,914	1,514	3,052	0,708	0,011	1,676	0,354				
	35-44	3.344	5,382	71,172	2,604	3,660	1,825	3,078	5,173	0,102	1,962	19,437				
	50-59	2.256	1,329	46,631	1,433	3,074	0,999	2,681	7,402	0,136	1,844	49,734				

* O total de 100% situa-se pela soma de pessoas sadias, com necessidade de higiene oral, com todos os sextantes sadios e ainda pelos que só têm sextantes sadios ou nulos. Esse último dado não constou na tabela.

7.4. Doenças periodontais em adolescentes e adultos: dados comparativos para os maxilares superior e inferior

A comparação entre as condições de saúde periodontal dos maxilares superior e inferior está nas tabelas 11.1 a 12.6, possibilitando as seguintes conclusões de caráter genérico:

- a) há uma nítida similaridade quanto aos dados referentes aos códigos diagnósticos 0 (sextantes sadios) e 1 (estágio inicial da doença, com sangramento); exceto na faixa de 50-59 anos, onde se constata uma pior situação para o maxilar inferior;
- b) a presença de tártaro e de bolsas é mais pronunciada no maxilar inferior, principalmente nas faixas de idades adultas;
- c) a grande proporção de sextantes nulos deve obrigatoriamente ser levada em consideração entre adultos, sendo mais séria no caso do maxilar superior, onde atinge a 46% entre os 35-44 anos e 76% entre os 50-59 anos, denunciando a realização maciça de extrações totais;
- d) na condição de sadios, encontram-se somente 53% dos maxilares superiores e 50% dos inferiores, na adolescência (15-19 anos), percentuais que gradativamente se reduzem até atingirem a escassos 5% entre os 50 e 59 anos;
- e) quanto às diferenças por nível de renda familiar, observa-se uma situação em geral mais crítica para as pessoas na faixa de até dois salários-mínimos, as quais também apresentam um maior percentual de sextantes nulos;
- f) algumas diferenças regionais, como as encontradas no Nordeste e no Sul, com menores proporções de sextantes sadios que os demais, sugerem a necessidade de análises mais detidas sobre suas causas.

TABELA 11.1 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Núlos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Núlos
Até 2	15-19	353	615	139	171	39	5	90	684	131	173	33	2	36
	35-44	217	120	14	42	1	401	169	50	146	73	3	210	
	50-59	200	36	7	17	7	502	53	26	97	33	10	381	
3 e 4	15-19	208	323	110	139	21	0	28	336	122	144	13	1	8
	35-44	83	34	19	14	2	0	180	37	49	54	0	0	92
	50-59	71	7	1	2	0	0	202	13	13	18	6	0	163
5 e mais	15-19	190	415	57	69	10	2	17	395	77	86	6	0	6
	35-44	31	9	8	13	3	0	60	18	12	13	8	0	42
	50-59	26	6	0	5	2	0	65	9	8	11	2	0	48
Total	15-19	751	1.353	306	379	70	7	135	1.415	330	403	52	3	50
	35-44	331	163	41	100	47	1	641	224	111	213	98	3	344
	50-59	297	49	8	38	20	7	769	75	47	126	41	10	592

TABELA 11.2 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Núlos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Núlos
Até 2	15-19	345	403	158	319	42	4	109	391	138	371	48	2	85
	35-44	375	91	112	256	91	31	544	61	429	119	38	403	
	50-59	179	7	17	60	40	19	394	6	88	46	27	355	
3 e 4	15-19	311	489	122	244	27	4	47	444	157	265	25	8	34
	35-44	216	93	69	171	27	11	277	85	259	38	11	187	
	50-59	116	9	12	43	11	12	258	5	58	26	17	226	
5 e mais	15-19	434	743	205	312	19	2	20	615	204	439	12	6	26
	35-44	113	67	61	83	27	8	90	57	33	156	4	4	64
	50-59	64	14	4	18	4	7	145	13	5	39	6	6	116
Total	15-19	1.090	1.635	485	875	88	10	176	1.450	499	1.075	85	16	145
	35-44	704	251	242	510	145	50	911	203	176	844	53	53	654
	50-59	359	30	33	121	55	38	797	24	185	85	50	50	697

TABELA 11.3 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	550	354	324	50	3	48	532	338	388	32	5	34
	35-44	494	181	162	227	81	30	801	206	309	108	30	643	
	50-59	337	41	41	54	50	27	795	51	105	53	52	700	
3 e 4	15-19	499	915	313	212	35	1	21	972	273	205	29	3	15
	35-44	344	187	114	155	62	14	499	188	229	70	41	378	
	50-59	268	48	36	45	30	16	629	53	98	34	23	546	
5 e mais	15-19	562	1.147	425	91	8	0	15	1.122	398	152	7	0	7
	35-44	358	317	203	159	55	8	332	279	266	63	16	243	
	50-59	286	56	56	84	39	12	611	56	170	30	26	490	
Total	15-19	1.504	2.612	1.092	627	93	4	84	2.626	1.009	745	68	8	56
	35-44	1.196	685	479	541	198	52	1.632	673	804	241	87	1264	
	50-59	891	145	133	183	119	55	2.035	160	373	117	101	1736	

TABELA 11.4 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sádios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	126	223	246	31	0	25	112	178	318	27	0	16
	35-44	237	35	97	175	71	14	319	26	244	102	19	228	
	50-59	188	6	17	35	17	5	484	2	69	41	15	428	
3 e 4	15-19	170	190	166	141	3	0	10	144	146	212	1	1	6
	35-44	154	72	91	83	29	2	185	57	169	31	0	128	
	50-59	134	19	27	41	21	6	288	9	95	20	4	249	
5 e mais	15-19	327	436	413	127	0	5	260	260	283	5	0	2	
	35-44	156	96	130	99	30	6	107	76	216	22	5	73	
	50-59	106	24	58	47	20	5	164	17	82	22	5	146	
Total	15-19	714	752	802	514	34	0	40	516	755	813	33	1	24
	35-44	547	203	318	357	130	22	611	159	629	155	24	429	
	50-59	428	49	102	123	58	16	936	28	246	83	24	823	

TABELA 11.5 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior						Sextantes maxilar inferior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	386	99	232	20	4	48	406	73	239	23	2	46
	35-44	276	107	29	147	32	11	502	110	27	218	26	17	430
	50-59	143	18	2	35	12	1	361	18	4	58	15	3	331
3 e 4	15-19	184	342	58	126	13	0	13	330	55	141	9	0	17
	35-44	141	89	20	80	27	4	203	90	15	105	20	4	89
	50-59	51	14	7	19	3	0	110	20	6	40	7	1	79
5 e mais	15-19	292	561	86	203	16	1	9	496	78	278	12	1	11
	35-44	149	194	21	67	40	10	115	181	21	124	24	5	92
	50-59	87	63	6	29	9	1	150	53	21	44	11	1	131
Total	15-19	739	1.289	243	561	49	5	70	1.232	206	658	44	3	74
	35-44	566	390	70	294	99	25	820	381	63	447	70	26	711
	50-59	281	95	15	83	24	2	621	91	31	142	33	5	541

TABELA 11.6 — Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior						Sextantes maxilar inferior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	2.080	973	1.292	182	16	320	2.125	858	1.489	163	11	217
	35-44	1.599	534	414	878	317	87	2.567	572	430	1.346	428	107	1914
	50-59	1.047	108	84	215	136	59	2.536	130	104	417	188	107	2195
3 e 4	15-19	1.372	2.259	769	862	99	5	119	2.226	753	967	77	13	80
	35-44	938	475	313	503	147	31	1.344	457	335	816	176	56	974
	50-59	640	97	83	150	66	34	1.487	100	110	309	93	45	1263
5 e mais	15-19	1.805	3.302	1.186	802	53	5	66	2.888	1.188	1.238	42	7	52
	35-44	807	683	423	421	155	32	704	611	349	775	142	30	514
	50-59	569	163	124	183	74	25	1.135	148	166	346	78	38	931
Total	15-19	4.798	7.641	2.928	2.956	334	26	505	7.239	2.799	3.694	282	31	349
	35-44	3.344	1.692	1.150	1.802	619	150	4.615	1.640	1.114	2.937	746	193	3402
	50-59	2.256	368	291	548	276	118	5.158	378	380	1.072	359	190	4389

TABELA 12.1 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	58,073	13,125	16,147	3,682	0,472	8,498	64,589	12,370	16,336	3,116	0,188	3,39
	35-44	217	18,433	2,150	11,213	6,451	0,153	61,597	25,960	22,427	11,213	0,460	31,95	
	50-59	200	6,000	1,166	5,166	2,833	1,166	83,666	8,833	4,333	16,166	5,500	1,666	63,50
3 e 4	15-19	208	51,762	17,628	22,275	3,365	0,000	4,487	53,846	19,551	23,076	2,083	0,160	0,80
	35-44	83	13,654	7,630	5,622	0,803	0,000	72,289	14,859	21,686	6,827	0,000	36,94	
	50-59	71	3,286	0,469	0,938	0,469	0,000	94,835	6,103	8,450	2,816	0,000	76,52	
5 e mais	15-19	190	72,807	10,000	12,105	1,754	0,350	2,982	69,298	13,508	15,087	1,052	0,000	1,05
	35-44	31	9,677	8,602	13,978	3,225	0,000	64,516	19,354	13,978	8,602	0,000	45,16	
	50-59	26	7,692	0,000	6,410	2,564	0,000	83,333	11,538	14,102	2,564	0,000	61,53	
Total	15-19	751	60,053	13,581	16,822	3,106	0,310	5,992	62,805	14,647	17,887	2,308	0,133	2,08
	35-44	331	16,414	4,128	10,070	4,733	0,100	64,551	22,557	21,450	9,869	0,302	34,44	
	50-59	297	5,499	0,897	4,264	2,244	0,785	86,307	8,417	14,141	4,601	1,122	66,44	

TABELA 12.2 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	38,937	15,265	30,821	4,057	0,386	10,531	37,777	13,333	35,845	4,637	0,193	8,21
	35-44	375	8,088	9,955	22,755	8,088	2,755	48,355	5,422	6,666	38,133	10,577	3,377	35,82
	50-59	179	1,303	3,165	11,173	7,448	3,538	73,370	1,117	2,793	16,387	8,566	5,027	65,92
3 e 4	15-19	311	52,411	13,076	26,152	2,893	0,428	5,037	47,588	16,827	28,403	2,679	0,857	3,42
	35-44	216	14,351	10,648	26,388	4,166	1,697	42,746	13,117	10,493	39,969	5,864	1,697	28,85
	50-59	116	2,586	3,448	12,356	3,160	3,448	74,137	1,436	4,597	16,666	7,471	4,885	64,36
5 e mais	15-19	434	57,066	15,745	23,963	1,459	0,153	1,536	47,235	15,668	33,717	0,921	0,460	1,99
	35-44	113	19,764	17,994	24,483	7,964	2,359	26,548	16,814	9,734	46,017	7,374	1,179	17,99
	50-59	64	7,291	2,083	9,375	2,083	3,645	75,520	6,770	2,604	20,312	6,770	3,125	60,41
Total	15-19	1,090	50,000	14,831	26,758	2,691	0,305	5,382	44,342	15,259	32,874	2,599	0,489	4,37
	35-44	704	11,884	11,458	24,147	6,865	2,367	43,134	9,611	8,333	39,962	8,617	2,509	30,82
	50-59	359	2,785	3,064	11,234	5,106	3,528	74,001	2,228	3,342	17,177	7,892	4,642	64,43

TABELA 12.3 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	41,384	26,636	24,379	3,762	0,225	3,611	40,030	25,432	29,194	2,407	0,376	2,40
	35-44	494	12,213	10,931	15,317	5,465	2,024	54,048	12,550	20,850	7,287	2,024	43,18	
	50-59	337	4,055	4,055	5,341	4,945	2,670	78,635	4,945	10,385	5,242	5,143	69,04	
3 e 4	15-19	499	61,122	20,908	14,161	2,338	0,066	1,402	64,929	18,236	13,694	1,937	0,200	0,93
	35-44	344	18,120	11,046	15,019	6,007	1,356	48,352	12,209	22,189	6,782	3,972	36,62	
	50-59	268	5,970	4,477	5,597	3,731	1,990	78,233	6,218	12,189	4,228	2,860	67,78	
5 e mais	15-19	562	68,030	25,207	5,397	0,474	0,000	0,889	66,548	23,606	9,015	0,415	0,000	0,35
	35-44	358	29,515	18,901	14,804	5,121	0,744	30,912	19,273	24,767	5,865	1,489	22,62	
	50-59	286	6,526	6,526	9,790	4,545	1,398	71,212	10,023	19,813	3,496	3,030	56,87	
Total	15-19	1.504	57,890	24,202	13,896	2,061	0,088	1,861	58,200	22,362	16,511	1,507	0,177	1,15
	35-44	1.196	19,091	13,350	15,078	5,518	1,449	45,484	18,756	22,408	6,716	2,424	35,14	
	50-59	891	5,424	4,975	6,846	4,451	2,057	76,131	6,958	13,954	4,377	3,778	64,75	

TABELA 12.4 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior					Sextantes maxilar inferior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	19,354	34,254	37,788	4,761	0,000	3,840	17,204	27,342	48,847	4,147	0,000	2,45
	35-44	237	4,922	13,642	24,613	9,985	1,969	44,866	3,656	12,939	34,317	14,345	2,672	32,06
	50-59	188	1,063	3,014	6,205	3,014	0,886	85,815	0,354	1,595	12,234	7,269	2,659	75,88
3 e 4	15-19	170	37,254	32,549	27,647	0,588	0,000	1,960	28,235	28,627	41,568	0,196	0,196	1,17
	35-44	154	15,584	19,696	17,965	6,277	0,432	40,043	12,337	16,666	36,580	6,709	0,000	27,70
	50-59	134	4,726	6,716	10,199	5,223	1,492	71,641	2,238	6,218	23,631	4,975	0,995	61,94
5 e mais	15-19	327	44,444	42,099	12,945	0,000	0,000	0,509	26,503	43,934	28,848	0,509	0,000	0,20
	35-44	156	20,512	27,777	21,153	6,410	1,282	22,863	16,239	46,153	4,700	1,068	15,59	
	50-59	106	7,547	18,238	14,779	6,289	1,572	51,572	5,345	14,465	25,786	6,918	1,572	45,91
Total	15-19	714	35,107	37,441	23,996	1,587	0,000	1,867	24,089	35,247	37,955	1,540	0,046	1,12
	35-44	547	12,370	19,378	21,755	7,921	1,340	37,233	9,689	38,330	9,445	1,462	1,462	26,14
	50-59	428	3,816	7,943	9,579	4,517	1,246	72,897	2,180	19,158	6,464	1,869	1,869	64,09

88 **TABELA 12.5** – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro Oeste. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior						Sextantes maxilar inferior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	48,922	12,547	29,404	2,534	0,506	6,083	51,457	9,252	30,291	2,915	0,253	5,83
	35-44	276	12,922	3,502	17,753	3,864	1,328	60,628	13,285	26,328	3,140	2,053	51,81	
	50-59	143	4,195	0,466	8,158	2,797	0,233	84,149	4,195	0,932	13,519	3,496	0,699	77,15
3 e 4	15-19	184	61,956	10,507	22,826	2,355	0,000	2,355	59,782	9,963	25,543	1,630	0,000	3,07
	35-44	141	21,040	4,728	18,912	6,382	0,945	47,990	21,276	24,822	4,728	0,945	44,68	
	50-59	51	9,150	4,575	12,418	1,960	0,000	71,895	13,071	3,921	26,143	4,575	0,653	51,63
5 e mais	15-19	292	64,041	9,817	23,173	1,826	0,114	1,027	56,621	8,904	31,735	1,369	0,114	1,02
	35-44	149	43,400	4,697	14,988	8,948	2,237	25,727	40,492	27,740	5,369	1,118	20,58	
	50-59	87	24,137	2,298	11,111	3,448	0,383	57,471	20,306	16,858	4,214	0,383	48,65	
Total	15-19	739	58,141	10,960	25,304	2,210	0,225	3,157	55,570	9,291	29,679	1,984	0,135	3,24
	35-44	566	22,968	4,122	17,314	5,830	1,472	48,292	22,438	26,325	4,122	1,531	41,81	
	50-59	281	11,269	1,779	9,845	2,846	0,237	73,665	10,794	16,844	3,914	0,593	63,70	

TABELA 12.6 – Código e estado de saúde periodontal para o conjunto dos três sextantes dos maxilares superior e inferior, segundo o nível de renda nos grupos de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Em percentual.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextantes maxilar superior						Sextantes maxilar inferior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	42,771	20,008	26,567	3,742	0,329	6,580	43,697	17,643	30,618	3,351	0,226	4,42
	35-44	1.599	11,131	8,630	18,303	6,608	1,813	53,512	11,924	28,059	8,922	2,230	39,77	
	50-59	1.047	3,438	2,674	6,844	4,329	1,878	80,738	4,138	13,276	5,985	3,406	69,78	
3 e 4	15-19	1.372	54,883	18,683	20,942	2,405	0,121	2,891	54,081	18,294	23,493	1,870	0,315	1,79
	35-44	938	16,879	11,122	17,874	5,223	1,101	47,761	16,240	28,997	6,254	1,990	34,61	
	50-59	640	5,052	4,322	7,812	3,437	1,770	77,447	5,208	16,093	4,843	2,343	65,62	
5 e mais	15-19	1.805	60,978	21,902	14,810	0,978	0,092	1,218	53,333	21,939	22,862	0,775	0,129	0,90
	35-44	807	28,211	17,472	17,389	6,402	1,321	29,078	25,237	32,011	5,865	1,239	21,10	
	50-59	569	9,548	7,264	10,720	4,335	1,464	66,490	8,670	20,269	4,569	2,226	54,18	
Total	15-19	4.798	53,084	20,341	20,536	2,320	0,180	3,508	50,291	19,445	25,663	1,959	0,215	2,34
	35-44	3.344	16,866	11,463	17,962	6,170	1,495	46,002	16,347	29,276	7,436	1,923	33,82	
	50-59	2.256	5,437	4,299	8,096	4,078	1,743	76,211	5,585	15,839	5,304	2,807	64,67	

7.5. Doenças periodontais em adolescentes e adultos: por sextante

O conjunto de tabelas sob números 13.1 a 18.6 detalham o quadro epidemiológico relativo às doenças periodontais para cada um dos sextantes em que se divide a estrutura dentária, fornecendo farta informação primária aos estudiosos desta importante área. De 13.1 a 15.6 temos as frequências absolutas, e de 16.1 a 18.6, os percentuais.

Uma síntese dos dados totais do Brasil, por sextante, compõe a tabela 13.0 a seguir, revelando fundamentalmente que:

- a) o sextante central superior (bateria labial superior) é, dentre todos, o que apresenta melhores condições de saúde nas três faixas etárias analisadas, devido a seus índices mais favoráveis de higidez e menores índices de enfermidade (vide letra "f");
- b) ainda que as diferenças sejam em geral pouco pronunciadas entre os sextantes posteriores, dois deles — o superior direito e o superior esquerdo — surgem com maior frequência como sendo os mais problemáticos;

- c) particularmente quanto à presença de tártaro nos grupos de 35-44 e 50-59 anos, a pior condição localiza-se no sextante central inferior;
- d) os níveis percentuais de higidez são muito reduzidos nos adultos, chegando a apenas 4,4% no caso do sextante superior esquerdo, na faixa de 50-59 anos;
- e) há uma elevada presença de bolsas periodontais (exceto no sextante superior central) no grupo de 35-44 anos, afetando em média, aproximadamente, 92% de todos os sextantes;
- f) a ausência de dentes-índices, tornando nulo o sextante, é um dado predominante na análise relativa das doenças periodontais no caso brasileiro, coincidindo com altos níveis de edentulismo, especialmente no maxilar superior. O sextante central inferior é a principal exceção, mas, mesmo assim, 22% foram considerados nulos na faixa de 35-44 anos e 52% na faixa de 50-59 anos. O sextante central superior, considerado como o mais saudável dentre os existentes, lidera a estatística dos nulos ao aparecer como o setor bucal mais sujeito a extrações para colocação precoce de próteses parciais ou totais.

TABELA 13.0 — Estado de saúde periodontal por sextantes — Brasil.
Em percentual.

Diagnóstico e grupo etário	0 (Sadios)			1 (Sangramento)			2 (Tártaro)			3 e 4 (Bolsas)			X (Nulos)		
	15-19	35-44	50-59	15-19	35-44	50-59	15-19	35-44	50-59	15-19	35-44	50-59	15-19	35-44	50-59
Sextante	48,3	15,3	4,8	20,6	10,7	3,7	24,9	19,8	8,9	3,4	9,7	7,0	2,8	44,4	75,5
Superior direito	65,1	21,5	7,0	19,8	13,7	6,0	9,1	12,6	6,3	1,0	3,8	3,7	5,0	48,3	76,9
Superior central	45,9	13,7	4,5	20,7	10,0	3,2	27,6	21,5	9,1	3,1	9,5	6,7	2,7	45,3	76,3
Superior esquerdo	48,0	15,4	5,6	20,6	10,0	4,9	25,7	26,6	12,0	2,6	8,3	6,4	3,1	39,6	71,0
Inferior direito	55,6	17,0	5,1	17,1	12,7	6,8	25,0	36,6	23,4	1,4	10,9	11,3	0,9	22,6	53,2
Inferior central	47,3	16,7	6,1	20,7	10,6	5,1	26,3	24,6	12,1	2,5	8,8	6,6	3,1	39,2	69,8

TABELA 13.1 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	186	52	64	20	2	29	256	35	24	3	1	34
	35-44	217	37	4	30	17	0	129	48	16	8	0	0	138
	50-59	200	9	3	13	8	3	164	17	4	3	1	0	173
3 e 4	15-19	208	85	40	61	13	0	8	148	30	15	2	0	13
	35-44	83	9	8	6	1	0	59	16	4	2	0	0	61
	50-59	71	2	1	1	0	0	67	3	0	0	0	0	68
5 e mais	15-19	190	128	23	25	7	1	6	161	16	6	0	0	7
	35-44	31	3	2	5	1	0	20	4	3	2	1	0	21
	50-59	26	2	0	1	1	0	22	2	0	3	0	0	21
Total	15-19	751	399	115	150	40	3	43	565	81	45	5	1	54
	35-44	331	49	14	41	19	0	208	68	14	20	9	0	220
	50-59	297	13	4	15	9	3	253	22	7	3	1	0	262

TABELA 13.2 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	113	45	135	21	3	28	170	63	49	5	0	58
	35-44	375	27	31	88	41	15	173	46	49	63	15	2	200
	50-59	179	2	3	21	16	8	129	4	10	20	8	1	136
3 e 4	15-19	311	150	36	102	14	2	7	208	42	26	4	0	31
	35-44	216	20	18	75	11	6	86	50	34	27	3	0	102
	50-59	116	2	2	14	5	6	86	5	6	13	4	0	88
5 e mais	15-19	434	232	63	126	7	1	4	300	78	44	0	0	12
	35-44	113	17	17	36	14	3	25	31	27	17	1	1	36
	50-59	64	5	1	6	2	4	46	4	3	5	0	1	51
Total	15-19	1.090	495	144	363	42	6	39	678	183	119	9	0	101
	35-44	704	64	66	199	66	24	284	127	110	107	19	3	338
	50-59	359	9	6	41	23	18	261	13	19	38	12	2	275

TABELA 13.3 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	166	117	130	16	1	13	223	121	67	12	0	20
	35-44	494	51	53	81	31	11	267	81	60	16	8	268	
	50-59	337	13	12	20	17	13	261	17	15	12	4	273	
3 e 4	15-19	499	288	104	86	15	0	6	343	102	37	5	0	12
	35-44	344	59	40	47	29	6	163	83	47	11	2	168	
	50-59	268	13	11	19	10	6	209	20	13	8	4	207	
5 e mais	15-19	562	376	141	35	5	0	5	408	139	10	0	0	5
	35-44	358	109	62	54	23	2	108	119	73	41	8	1	116
	50-59	286	18	19	27	14	5	203	23	22	9	3	207	
Total	15-19	1.504	830	362	251	36	1	24	974	362	114	17	0	37
	35-44	1.196	219	155	182	83	19	538	283	148	35	11	552	
	50-59	891	44	42	66	41	24	673	60	50	29	11	687	

TABELA 13.4 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito					Sextante central superior						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	24	68	103	15	0	7	75	97	30	7	0	8
	35-44	237	5	30	63	32	5	102	22	41	52	12	1	109
	50-59	188	2	4	12	8	2	160	2	9	10	4	2	161
3 e 4	15-19	170	49	59	58	2	0	2	96	49	20	0	0	5
	35-44	154	21	28	32	12	1	60	31	41	14	5	1	62
	50-59	134	4	7	17	8	2	96	10	15	8	6	1	94
5 e mais	15-19	327	126	147	53	0	0	1	190	116	18	0	0	3
	35-44	156	31	42	35	12	2	34	39	53	20	5	2	37
	50-59	106	8	16	16	10	2	54	11	29	10	2	1	53
Total	15-19	714	199	274	214	17	0	10	361	262	68	7	0	16
	35-44	547	57	100	130	56	8	196	92	135	86	22	4	208
	50-59	428	14	27	45	26	6	310	23	53	28	12	4	308

TABELA 13.5 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	263	114	41	90	4	2	12	168	26	41	6	1	21
	35-44	276	34	7	56	12	4	163	45	17	28	7	1	178
	50-59	143	4	1	15	4	1	118	8	1	8	6	0	120
3 e 4	15-19	184	103	22	48	6	0	5	142	13	22	2	0	5
	35-44	141	26	9	28	12	3	63	38	8	18	4	0	73
	50-59	51	4	2	7	1	0	37	8	2	4	1	0	36
5 e mais	15-19	292	177	29	78	6	0	2	235	22	28	2	0	5
	35-44	149	64	8	25	12	7	33	67	6	16	11	1	48
	50-59	87	20	1	12	2	0	51	24	4	7	2	1	49
Total	15-19	739	394	92	216	16	2	19	545	61	91	10	1	31
	35-44	566	124	24	109	36	14	259	150	31	62	22	2	299
	50-59	281	28	4	34	7	1	206	40	7	19	9	1	205

TABELA 13.6 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior direito						Sextante central superior					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	603	323	522	76	8	89	892	342	211	33	2	141
	35-44	1.599	154	125	318	133	35	834	242	175	219	58	12	893
	50-59	1.047	30	23	81	53	27	832	48	38	57	33	8	863
3 e 4	15-19	1.372	675	261	355	50	2	28	937	236	120	13	0	66
	35-44	938	135	103	188	65	16	431	218	120	108	23	3	466
	50-59	640	25	23	58	24	14	495	46	39	38	19	5	493
5 e mais	15-19	1.805	1.039	403	317	25	2	18	1.294	371	106	2	0	32
	35-44	807	224	131	155	62	14	220	260	162	96	26	5	258
	50-59	569	53	37	62	29	11	376	64	58	47	13	6	381
Total	15-19	4.798	2.317	987	1.194	151	12	135	3.123	949	437	48	2	239
	35-44	3.344	513	359	661	260	65	1.485	720	457	423	107	20	1617
	50-59	2.256	108	83	201	106	52	1.703	158	135	142	65	19	1737

TABELA 14.1 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	173	52	83	16	2	27	17	53	55	15	1	12
	35-44	217	35	3	27	17	1	134	54	15	45	23	1	79
	50-59	200	10	2	14	6	3	165	15	7	34	7	4	133
3 e 4	15-19	208	90	40	63	6	0	8	96	41	57	9	1	4
	35-44	83	9	7	6	1	0	60	5	13	17	5	0	43
	50-59	71	2	0	1	1	0	67	2	3	4	1	0	61
5 e mais	15-19	190	126	18	38	3	1	4	123	28	33	3	0	3
	35-44	31	2	3	6	1	0	19	6	2	3	3	0	17
	50-59	26	2	0	1	1	0	22	2	2	2	0	0	20
Total	15-19	751	389	110	184	25	3	39	436	122	145	27	2	19
	35-44	331	46	13	39	19	1	213	65	30	65	31	1	139
	50-59	297	14	2	16	8	3	254	19	12	40	8	4	214

TABELA 14.2 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	120	50	135	16	1	23	126	45	121	18	0	35
	35-44	375	18	32	105	35	14	171	16	23	133	40	12	151
	50-59	179	1	4	19	16	10	129	1	3	24	14	7	130
3 e 4	15-19	311	131	44	116	9	2	9	126	49	107	11	3	15
	35-44	216	23	17	69	13	5	89	20	14	95	12	5	70
	50-59	116	2	4	16	2	6	85	2	4	12	10	6	82
5 e mais	15-19	434	211	64	142	12	1	4	188	75	153	5	2	11
	35-44	113	19	17	30	12	4	30	16	7	51	11	1	27
	50-59	64	5	0	7	2	2	48	5	1	10	3	3	42
Total	15-19	1.090	462	158	393	37	4	36	440	169	381	34	5	61
	35-44	704	60	66	204	60	23	290	52	44	279	63	18	248
	50-59	359	8	8	42	20	18	262	8	8	46	27	16	254

TABELA 14.3 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	161	116	127	22	2	15	172	118	130	7	3	13
	35-44	494	49	48	86	34	11	266	52	94	31	5	247	
	50-59	337	11	13	19	21	10	262	16	21	11	11	262	
3 e 4	15-19	499	284	107	89	15	1	3	328	92	59	10	2	8
	35-44	344	45	41	61	22	6	168	42	63	14	9	148	
	50-59	268	15	9	13	12	6	213	14	27	6	4	199	
5 e mais	15-19	562	363	145	46	3	0	5	380	128	49	3	0	2
	35-44	358	89	68	64	24	5	108	70	69	21	3	97	
	50-59	286	15	15	35	16	4	201	29	43	8	7	177	
Total	15-19	1.504	808	368	262	40	3	23	880	338	238	20	5	23
	35-44	1.196	183	157	211	80	22	542	164	226	66	17	492	
	50-59	891	41	37	67	49	20	676	59	91	25	22	638	

TABELA 14.4 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo					Sextante maxilar inferior direito						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	27	58	113	9	0	10	30	60	108	11	0	8
	35-44	237	8	26	60	27	8	108	7	79	31	4	4	87
	50-59	188	2	4	13	5	1	163	1	17	9	3	3	155
3 e 4	15-19	170	45	58	63	1	0	3	48	53	66	0	0	3
	35-44	154	20	22	37	12	0	63	19	48	12	0	0	49
	50-59	134	5	5	16	7	3	98	5	23	5	1	1	92
5 e mais	15-19	327	120	150	56	0	0	1	87	152	85	3	0	0
	35-44	156	26	35	44	13	2	36	24	67	7	2	2	29
	50-59	106	5	13	21	8	2	57	5	22	10	2	2	54
Total	15-19	714	192	266	232	10	0	14	165	265	259	14	0	11
	35-44	547	54	83	141	52	10	207	50	82	194	50	6	165
	50-59	428	12	22	50	20	6	318	11	62	24	6	6	301

TABELA 14.5 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Centro-Oeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2.	15-19	263	104	32	101	10	1	15	128	30	73	9	1	22
	35-44	276	28	5	63	13	6	161	27	60	7	5	172	
	50-59	143	6	0	12	2	0	123	6	11	5	0	120	
3 e 4	15-19	184	97	23	56	5	0	3	97	25	50	4	0	8
	35-44	141	25	3	34	11	1	67	27	32	4	0	74	
	50-59	51	2	3	8	1	0	37	7	9	3	0	29	
5 e mais	15-19	292	149	35	97	8	1	2	155	38	86	5	0	8
	35-44	149	63	7	26	17	2	34	63	4	35	8	2	37
	50-59	87	19	1	10	5	0	51	19	11	4	0	49	
Total	15-19	739	350	90	254	23	2	20	380	93	209	18	1	38
	35-44	566	116	15	123	41	9	262	117	13	127	19	7	283
	50-59	281	27	4	30	8	0	211	32	31	12	0	0	198

TABELA 14.6 – Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, no Brasil. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante maxilar superior esquerdo						Sextante maxilar inferior direito					
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	1.621	585	308	559	73	6	90	673	306	487	60	5	90
	35-44	1.599	138	114	341	126	40	840	169	124	411	132	27	736
	50-59	1.047	30	23	77	50	24	842	39	30	107	46	25	800
3 e 4	15-19	1.372	647	272	387	36	3	26	695	260	339	34	6	38
	35-44	938	122	90	207	59	12	447	139	99	255	47	14	384
	50-59	640	26	21	54	23	15	500	34	32	75	25	11	463
5 e mais	15-19	1.805	969	412	379	26	3	16	933	421	406	19	2	24
	35-44	807	199	130	170	67	13	227	207	110	225	50	8	207
	50-59	569	46	29	74	32	8	379	53	49	88	25	12	342
Total	15-19	4.798	2.201	992	1.325	135	12	132	2.301	987	1.232	113	13	152
	35-44	3.344	459	334	718	252	65	1.514	515	333	891	229	49	1327
	50-59	2.256	102	73	205	105	47	1.721	126	111	270	96	48	1605

TABELA 15.1 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Norte. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	353	254	32	54	3	0	10	213	46	64	15	1	14
	35-44	217	45	23	62	25	1	61	70	12	39	25	1	70
	50-59	200	14	12	34	15	3	122	24	7	29	11	3	126
3 e 4	15-19	208	148	33	25	0	0	1	92	48	62	4	0	2
	35-44	83	13	22	23	7	0	18	19	14	14	5	0	31
	50-59	71	5	7	10	1	0	48	6	4	4	4	0	54
5 e Mais	15-19	190	151	20	18	0	0	1	121	29	35	3	0	2
	35-44	31	3	9	7	2	0	10	9	1	3	3	0	15
	50-59	26	0	4	7	2	0	13	7	2	2	0	0	15
Total	15-19	751	553	85	97	3	0	12	426	123	161	22	1	18
	35-44	331	61	54	92	34	1	89	98	27	56	33	1	116
	50-59	297	19	23	51	18	3	183	37	12	35	15	3	195

TABELA 15.2 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Nordeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	345	146	50	123	12	1	13	119	43	127	18	1	37
	35-44	375	30	29	160	46	13	97	15	23	136	33	13	155
	50-59	179	3	7	39	19	12	99	2	5	25	13	8	126
3 e 4	15-19	311	187	48	67	3	3	3	131	60	91	11	2	16
	35-44	216	45	34	73	14	3	47	20	20	91	12	3	70
	50-59	116	1	7	30	10	4	63	2	5	16	6	7	80
5 e mais	15-19	434	235	55	139	1	1	3	192	74	147	6	3	12
	35-44	113	24	16	56	4	0	12	17	10	49	10	3	24
	50-59	64	4	3	16	6	2	33	4	1	13	4	1	41
Total	15-19	1.090	568	153	329	16	5	19	442	177	365	35	6	65
	35-44	704	99	79	289	64	16	156	52	53	276	55	19	249
	50-59	359	8	17	85	35	18	195	8	11	54	23	16	247

88 **TABELA 15.3** — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sudeste. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	443	187	105	138	10	1	2	173	115	120	15	1	19
	35-44	494	77	79	141	19	132	64	55	74	33	6	262	
	50-59	337	17	20	62	24	179	18	14	22	18	7	258	
3 e 4	15-19	499	307	95	85	0	2	2	337	86	61	9	1	5
	35-44	344	57	41	110	16	80	63	43	56	16	16	150	
	50-59	268	22	21	49	18	143	13	15	22	10	5	203	
5 e mais	15-19	562	370	132	57	0	1	1	372	138	46	2	0	4
	35-44	358	88	63	129	11	45	93	74	68	20	2	101	
	50-59	286	16	28	87	12	130	18	29	40	10	7	182	
Total	15-19	1.504	864	332	280	1	5	882	339	227	26	2	28	
	35-44	1.196	222	183	380	46	257	220	172	198	69	24	513	
	50-59	891	55	69	198	60	452	49	58	84	38	19	643	

TABELA 15.4 — Código e estado de saúde periodontal por sextante, segundo o nível de renda nos grupos etários de 15-19, 35-44 e 50-59 anos, na região Sul. Frequências absolutas.

Estrato de renda familiar (Em sal. mínimos)	Idade (anos)	Número de pessoas examinadas	Sextante central inferior					Sextante maxilar inferior esquerdo						
			Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos	Sadios	Sangramento	Tártaro	Bolsas 4 a 5mm	Bolsas 6 e + mm	Nulos
Até 2	15-19	217	52	55	100	8	0	2	30	63	110	8	0	6
	35-44	237	11	31	95	36	10	54	8	32	70	35	5	87
	50-59	188	0	3	34	19	10	122	1	3	18	13	2	151
3 e 4	15-19	170	55	35	78	0	1	1	41	58	68	1	0	2
	35-44	154	17	24	70	9	0	34	21	51	51	10	0	45
	50-59	134	1	8	47	10	2	66	3	9	25	5	1	91
5 e mais	15-19	327	87	124	115	1	0	0	86	155	83	1	0	2
	35-44	156	23	24	88	5	15	29	29	25	61	10	2	29
	50-59	106	5	19	38	5	37	7	7	14	22	7	1	55
Total	15-19	714	194	214	293	9	1	3	157	276	261	10	0	10
	35-44	547	51	79	253	50	11	103	58	84	182	55	7	161
	50-59	428	6	30	119	34	14	225	11	26	65	25	4	297